

مزایای تماس پوست با پوست مادر و نوزاد پس از تولد:

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلاfaciale به بعداز تولد و شروع تغذیه باشیرمادرگرچه بهم مرتبط هستنداما هر کدام بطور مستقل از اهمیت خاصی برخوردارند. حتی اگر مادر قصد شیردهی نداشته باشد، این تماس اولیه باید برقرار شود.

نوزاد بلاfaciale پس از تولد باید بطور مداوم همراه مادر باشد تا به محض آمادگی، پستان مادررا بگیرد مگر آنکه دلیل پزشکی غیرقابل اجتنابی مطرح باشد. لذا باید پس از تولد نوزاد را خشک کرده و لخت روی سینه مادر بگذارند و مادر و نوزاد را با هم بپوشانند و حداقل برای مدت یک ساعت این تماس را ادامه دهند و از هردو مراقبت بعمل آورند. چنانچه تماس با مادر به هر دلیلی به تأخیر افتاد در این فاصله پدر یا یک عضو دیگرخانواده می توانند تماس پوست با پوست را با نوزاد برقرار نمایند.

برای نوزادانی که نارس هستند یا با ناتوانی و معلولیت متولد می شوند نیز تماس پوست با پوست بسیار مفید است. چنانچه علائم حیاتی نوزاد ثابت نیست و نیاز به توجه فوری دارد تماس پوستی با مادر را می توان تا زمان پایدار شدن وضعیت او به تأخیر انداخت. این اقدامات زیر نظر کارکنان بهداشتی درمانی انجام می شود.

مطالعات متعدد نشان داده‌اند که :

- تماس پوستی زودرس مادر و نوزاد منجر به افزایش قابل توجه میزان تغذیه با شیرمادر و طول مدت شیردهی در جامعه می شود.
- مادر و نوزاد را آرام می کند، ضربان قلب و تنفس نوزاد را ثبات می بخشد و او را گرم نگه می دارد.
- گریه نوزادان نسبت به آنهایی که جدا نگهداری می شوند کمتر است بنابراین اضطراب و مصرف انرژی آنان نیز کاهش می یابد.

برخی مزایای شروع زودرس تغذیه با شیرمادر برای نوزاد و مادر

آغوز یا کلسترولم بعنوان اولین تغذیه نوزاد نه تنها سرشار ازمود مغذی است. بلکه حاوی مواد ایمنی بخش است که بعنوان اولین واکسن نوزاد محسوب می شود و او را در برابر بسیاری از بیماری‌ها حفاظت کرده و به تنظیم سیستم ایمنی در حال تکامل نوزاد نیز کمک می کند. آغوز حاوی فاکتورهای رشد است که به تکامل و عملکرد موثر روده نوزاد کمک می کند. بعلاوه برای عوامل بیماری زا و حساسیت زا و رود به بدن نوزاد را مشکل می سازد. آغوز سرشار از ویتامین آ است که به حفاظت از چشمها و کاهش عفونت‌ها کمک می کند. عمل دفع را در نوزاد تحریک نموده و به خروج موادی که سبب زردی نوزاد می شوند کمک می کند. مقدار آغوز گرچه در ساعات اولیه پس از تولد کم است ولی می تواند نیاز نوزاد را برطرف نماید.

زود شروع کردن تغذیه با شیرمادر به تولید شیرکافی برای تغذیه بعدی کمک می کند.

رفلکس مکیدن نوزاد را (که در طول یک ساعت اول بسیار قوی است) برای گرفتن صحیح پستان بکار می اندادند. این مزیت به انقباض رحم و خروج جفت و کاهش خونریزی مادر کمک می کند.

امکان تماس پوست با پوست مادر و نوزاد را فراهم نموده و گرمای مورد نیاز نوزاد بتویژه نوزادان نارس و کم وزن را تامین می کند.

بدینهی است پس از زایمان طبیعی و یا سزارین بدون بیهوشی، تغذیه باشیرمادر را می توان بلاfaciale شروع نمود. در سزارین با بیهوشی عمومی، تغذیه با شیرمادر ظرف چند ساعت اول با کمک کارکنان به محض هوشیاری و امکان پاسخگویی مادر انجام می شود.

برای زایمان بیمارستان‌های دوستدار کودک را انتخاب کنید. در این بیمارستان‌ها ده اقدام برای شیردهی موفق اجرا می شود: کارکنان آموزش‌های لازم برای حمایت از تغذیه شیرخواران با شیرمادر را دیده‌اند و به شما برای شیردهی، بغل کردن و به پستان گذاشتن نوزاد بطرز صحیح کمک می کنند. اولین تماس پوست با پوست مادر و نوزاد را بلاfaciale پس از تولد در اتاق زایمان فراهم کرده و کمک می نمایند تا تغذیه نوزاد شما با شیر مادر ظرف یک ساعت اول تولد شروع شود. از شیرمصنوعی، شیشه شیر و پستانک استفاده نمی کنند. هریک از این اقدامات بر اساس مطالعات متعددی که در جهان انجام شده مزایای بسیاری برای مادر و کودک دارد که بعنوان ضوابط بین‌المللی برای مراقبت و تغذیه شیرخواران توصیه می شوند.


اجرای مطلوب این اقدامات که منجر به ارتقاء سلامت شیرخواران می گردد، مستلزم همکاری شما با کارکنان بهداشتی درمانی است.

در این نشریه شما **مادر گرامی** با اهمیت اولین تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلاfaciale بعد از تولد در اتاق زایمان و شروع تغذیه با شیرمادر ظرف یک ساعت اول تولد آشنا می شوید تا با شناخت این اقدامات از هیچ کوششی برای بهره‌مندی فرزندتان از شیرمادر دریغ ننمایید. مطالعه این نشریه شما کارمند محترم بهداشتی را در یادآوری نکات مهم مراقبت‌های ضروری مادر و نوزاد در ساعات اولیه تولد کمک می نماید.

شروع تغذیه با شیرمادر ظرف یک ساعت اول تولد اولین و حیاتی ترین کام برای کاهش مرگ و میر شیرخواران و کودکان است.

مطابق با اطلاعات موجود در جهان از کل ۱۰/۹ میلیون مرد کودکان زیر ۵ سال، تقریباً ۴ میلیون نوزاد در طول ماه اول عمر می میرند. یک مطالعه اخیر نشان داده است که اگر تمام زنان ظرف یک ساعت اول تولد تغذیه نوزادان خود را با شیرمادر شروع کنند، جان یک میلیون از ۴ میلیون نوزادی که هر سال در جهان می میرند حفظ می شود.

تغذیه با شیر مادر: ظرف یک ساعت اول تولد جان یک میلیون نوزاد را نجات مندید



- خیره شدن به ناحیه تیره پستان که همانند یک هدف عمل می‌کند
- یافتن ناحیه نوک پستان و گرفتن آن با دهان کاملاً باز، هیچ فشاری بر مادر و نوزاد که چکونه اولین تغذیه را انجام دهد، یا چه مدت اولین تغذیه طول بکشد و یا نوزاد چکونه پستان را گرفته یا چقدر آغوز دریافت می‌کند، نباید وارد شود.
- باید در نظر داشت که در اولین بار، آشناشی با پستان بر تغذیه ارجح است.

کمک بیشتر برای تغذیه از پستان مادر از تغذیه بعدی شروع می‌شود که کارکنان بهداشتی درمانی به مادر کمک می‌کنند تا نحوه بغل کردن و به پستان کذاشتن، روش صحیح تغذیه و دیگر مهارت‌های موردنیاز را یاد بگیرد.

چند نکته مهم:

- دادن هرنوع ماده‌ای قبل از شروع تغذیه با شیر مادر، احتمال خطر عفونت را افزایش داده. احتمال تغذیه انحصاری با شیر مادر را کمتر و طول مدت تغذیه با شیر مادر را کوتاه تر می‌کند.

• تغذیه انحصاری با شیر مادر (یعنی فقط شیر مادر بدون مصرف هیچ ماده غذایی دیگر) در ۶ ماه اول عمر حیاتی است. پس از آن تغذیه با شیر مادر را همراه با غذاهای کمکی در دو سال اول عمر ادامه دهید.

- برای تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر در ۶ ماه اول فقط شروع بموقع شیردهی در ساعت اول تولد کافی نیست، بلکه مشارکت خانواده، ماماهای عوامل زایمان و سایر کارکنان بهداشتی درمانی، برای حمایت مادر ضروری است.

اگر تماس پوستی با نوزاد را بلافضله پس از تولد و تغذیه نوزاد را با شیر مادر به محض آمادگی او شروع کنید، اساساً تندرستی او را بنا نهاده‌اید.

تهیه: سوسن سعدوندیان

با رهنمودهای: دکتر خلیل فریور - دکتر تابید عزالدین زنجانی

مرداد ۸۶

- نوزادی که در تماس نزدیک با مادر است می‌تواند به محض نشان دادن علام آمادگی (رفتارهای پیش از تغذیه*) پستان را بمکد اما نباید او را مجبور کرد زیرا بر رفتار بعدی او اثر سوء می‌گذارد.

• امکان جایگزینی باکتری‌های روده و پوست نوزاد را با باکتری‌های طبیعی مادر فراهم می‌کند. زیرا مادر اولین کسی است که کودک را در کنار خود دارد و بهتر است نوزاد با باکتری‌های او آشنا شود نه یک پرستار، پزشک یا شخص دیگر. این میکروب‌ها برای نوزاد نقش دفاعی خواهند داشت.

• لیس زدن یا مکیدن نوک پستان و آرئول توسط نوزاد ظرف نیم ساعت اول تولد همراه با تماس پوستی، تاثیر مثبت بر رابطه عاطفی مادر و نوزاد بوقتی در روزهای اول تولد دارد. در مطالعه‌ای دیده شد مادران این نوزادان به مدت کوتاه تری از آنها جدا می‌شدند و بیشتر با آنها حرف می‌زدند در مقایسه با نوزادانی که فقط تماس پوست با پوست بدون لمس نوک پستان داشتند.

• توجه کنید که حتی ۲۰ دقیقه جدایی مادر و نوزاد در طول ساعت اول تولد می‌تواند زیان آور باشد.

* رفتارهای پیش از تغذیه

رفتارهای پیش از تغذیه را تشخیص دهید. زمانی که مادر و نوزاد به آرامی در تماس پوست با پوست با یکدیگر هستند نوزاد به طور مشخص یک سری رفتارها را پیش از تغذیه انجام می‌دهد که ممکن است از چند دقیقه تا یک ساعت یا بیشتر طول بکشد.

این رفتارها عبارتنداز:

- یک استراحت کوتاه در زمان هوشیاری برای شناخت محیط جدید اطراف
- بردن دستها به دهان و انجام عمل مکیدن، ایجاد صدا و لمس نوک پستان با دستها