



بیماری تب مالت و کنترل آن

مقدمه

در دامها نیز این بیماری باعث کاهش وزن و شیردهی و سقط جنین و تلفات دامی می‌گردد که اثرات اقتصادی جبران ناپذیری را بر دامداران تحمیل می‌نماید.

رعایت نکات زیر برای جلوگیری از ابتلا به تب مالت ضروری است:

- استفاده از شیر و فراورده های لبنی به صورت پاستوریزه، ضمناً در صورت در دسترس نبودن شیر پاستوریزه با جوشاندن شیر به مدت ۱۰ الی ۵ دقیقه میکروب از بین می‌رود.
- استفاده از ماسک در هنگام ورود به محل نگهداری دام و کار با فضولات حیوانی

بیماری تب مالت یا بروسلوز یکی از شایعترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام است. این بیماری در اثر تماس مستقیم با دامهای آلوده و مواد دفعی و ترشحات دامها و یا تماس غیر مستقیم از طریق مصرف فرآورده های دامی به انسان منتقل می‌شود، به طوری که در سال ۸۵ بیش از ۸۶٪ از بیماران استان آذربایجان شرقی از جمعیت روستایی گزارش شده است. تب مالت یکی از مشکلات بهداشتی/ اقتصادی جامعه می‌باشد و در انسان باعث بروز شکل‌های مختلف و گاهی خطرناک بیماری مانند التهاب و درد مفاصل، عفونت استخوان و عفونت لایه ی داخلی قلب و بسیاری از عوارض دیگر می‌گردد. دوره های درمان بیماری طولانی و گران قیمت است و در بعضی موارد با وجود درمان، بیماری ممکن است عود نماید و یا به درمان مقاومت نشان دهد.





- از مصرف پنیر تازه محلی حتی به مقدار کم نیز خودداری کرده و پنیر محلی را حداقل به مدت ۲ ماه در آب نمک نگهداری نمایند.
- دامداران هر گونه سقط جنین حیوانی را به خانه بهداشت و اداره ی دامپزشکی اطلاع دهند.
- دامداران با اکیپ های واکسیناسیون دامپزشکی همکاری لازم جهت واکسیناسیون دامها را به عمل آورند.

- جداسازی و دور نمودن محل نگهداری دام از محل زندگی انسان
- استفاده از دستکش، کلاه، ماسک، عینک و روپوش جهت دامپزشکان، دامداران، چوپانان و پرسنل کشتارگاه و کسانیکه به زایمان دام کمک می نمایند.
- بعد از هر تماس با دام و تهیه فرآورده های لبنی باید دست ها را با آب و صابون شستشو نمایند.



گروه های هدف این متن آموزشی

- دامداران
- زنان خانه دار
- دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان مناطق روستایی

منابع استفاده شده در تهیه این متن آموزشی

- دستورالعمل کنترل و مراقبت بیماری تب مالت / مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / ۱۳۸۶

به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری تب مالت باید:

- از مصرف شیر خام و فرآورده های لبنی که از شیر غیر پاستوریزه یا شیری که به اندازه ی کافی نجوشیده، تهیه شده اند خودداری کرده و شیر خام را پس از جوشاندن بمدت ۱۰-۵ دقیقه استفاده نمایند.
- هنگام تمیز کردن محل نگهداری حیوانات از وسایل حفاظتی استفاده نمایند.
- ایجاد فاصله ی مناسب بین محل نگهداری دام و محل سکونت
- دست ها را بعد از تماس با دام و فرآورده های دامی با آب و صابون شستشو نمایند.