



## علایم خطر پس از زایمان

### مقدمه

- خروج ترشحات چرکی و بد بو از مهبل
  - درد زیر دل یا درد ساق پا
  - بی اختیاری دفع ادرار و مدفعه، درد یا سوزش هنگام ادرار کردن و تکرار ادرار
  - افسردگی شدید
  - سرگیجه و رنگ پریدگی
- شش هفته‌ی اول بعد از زایمان، دوران نقاوت پس از زایمان (نفاس) نامیده می‌شود. در این مدت نیز لازم است مادر در چند نوبت توسط کارکنان بهداشتی مراقبت شود. پدر و مادر نیز باید به تغییرات طبیعی و خطراتی که سلامت مادر و نوزاد را تهدید می‌کند آگاه بوده و در صورت بروز علایم خطر در اسرع وقت به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه نمایند.

در صورت مشاهده‌ی علایم ذکر شده، باید هر چه زودتر به پزشک متخصص یا سایر کارکنان بهداشتی مراجعه شود.

**بنابراین مادران باردار باید بدانند علایم خطر پس از زایمان عبارت است از:**

- تب و لرز
- خونریزی بیش از میزان قاعده‌گی در هر زمان و یا ادامه خونریزی بیشتر از حد، لکه بینی بعد از ده روز
- درد و ورم ناحیه بخیه‌ها



گروه‌های هدف این متن آموزشی



- مادران نوزادان
- کارشناسان
- بهورز

منابع استفاده شده در تهیه این متن آموزشی  
برگرفته از سایت وزارت بهداشت و درمان

- هر گونه درد، قرمزی و تورم پستانها
- لمس توده یا درد و تورم و خروج ترشحات چرکی از محل بخیه‌ها