

## سلامتی از حقوق اولیه هر کودک است

واکسیناسیون یکی از مهمترین اقداماتی است که پدر و مادر برای سلامتی کودک خود انجام می‌دهند.

بیماری‌های عفونی خطرناک، دلیل فوت بسیاری از نوزادان و کودکان خردسال هستند. این در حالی است که به آسانی، با واکسیناسیون کودکان، می‌توانیم از ابتلای آنها به این بیماری‌ها جلوگیری کنیم و آنها را برای همیشه ایمن نماییم. در حال حاضر واکسیناسیون از مرگ سه میلیون کودک در سال، در جهان جلوگیری می‌کند.

### چه کسانی به واکسن نیاز دارند؟

واکسن‌ها معمولاً برای نوزادان و کودکان خردسال تجویز می‌شوند زیرا بدن آنها در مقابل بیماری‌های خطرناک بسیار آسیب پذیر است.


### چه زمانی و در کجا واکسن بزنیم؟

کودکان و بخصوص نوزادان در سن‌های مختلف بر اساس یک برنامه زمان بندی منظم به واکسن‌های مختلف نیاز دارند. در کشور ما، واکسیناسیون از زمان تولد نوزاد در زایشگاه یا بیمارستان شروع می‌شود. در تمام مناطق شهری و روستایی کشور ما، همه مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت واکسیناسیون کودکان را بصورت رایگان انجام می‌دهند. در این مراکز یک «کارت مراقبت کودک» به والدین داده می‌شود که اطلاعات مهمی در مورد سابقه واکسیناسیون و نحوه رشد کودک در آن نوشته می‌شود. لازم است از این کارت به دقت نگهداری شود و در هر نوبت مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت، والدین آن را به همراه داشته باشند.



## ریشه‌کنی جهانی فلج اطفال

با قطره خوارکی و واکسن تزریقی



ویژه والدین

- می‌توانید کودک را پس از واکسیناسیون حمام کنید و یا محل تزریق واکسن را بشویید.

#### توجه :

در صورت تولد نوزاد در منزل، باید در اولین فرصت ممکن به نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت مراجعه نمایید و هر چه سریع‌تر واکسیناسیون کودک خود را شروع کنید.


### جدول واکسیناسیون کودکان کشور ایران

سن کودک	نوع واکسن
بدو تولد	فلج اطفال - سل - هپاتیت ب
دو ماهگی	فلج اطفال - هپاتیت ب - دیفتری - کزار - سیاه سرفه - هموفیلوس آنفولانزا تیپ ب
چهار ماهگی	فلج اطفال خوارکی و تزریقی - هپاتیت ب - دیفتری - کزار - سیاه سرفه - هموفیلوس آنفولانزا تیپ ب
شش ماهگی	فلج اطفال - هپاتیت ب - دیفتری - کزار - سیاه سرفه - هموفیلوس آنفولانزا تیپ ب
۱۲ ماهگی	سرخک - سرخجه - اوریون
۱۸ ماهگی	فلج اطفال - دیفتری - کزار - سیاه سرفه - سرخک - سرخجه - اوریون
۶ سالگی	فلج اطفال - دیفتری - کزار - سیاه سرفه



**نکته:**  
واکسیناسیون حتماً باید به موقع انجام شود.

**نکته:**  
در صورتی که نتوانستید کودک خود را به موقع برای واکسیناسیون ببرید، در اولین فرصت او را به مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت ببرید و حتماً به کارکنان بهداشتی در مورد به موقع نبودن مراجعه بگویید تا برنامه جدیدی در اختیار شما قرار دهدند.



**نکته:**  
همیشه واکسن نزدن و یا به تعویق انداختن بدون دلیل آن اشتباه است.

### توصیه‌های معمول برای بعد از تزریق واکسن

- پس از واکسیناسیون، تب مختصر، درد، تورم، سفتی در محل تزریق و بی قراری کودک شایع است، نگران نباشد.

- در صورتی که در محل تزریق واکسن، تورم و قرمزی وجود دارد، برای کاهش آن، یک پارچه سرد، مرطوب و تمیز روی محل تزریق واکسن قرار دهید.

- در صورت بروز تب، درد یا بی قراری، با کارکنان بهداشتی در مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت مشورت کنید.

- پس از واکسیناسیون، از پوشاندن لباس تنگ به کودک که موجب فشار آمدن به محل تزریق می‌شود، خودداری کنید.

## باورهای غلط در مورد واکسیناسیون

برخی پدر و مادرها به دلیل نگرانی‌های نابجا مانند موارد زیر، از واکسیناسیون به موقع کودکان خودداری می‌کنند. آگاه باشید، **هیچ یک از نگرانی‌های زیر دلیل درستی برای واکسن نزدن یا به تعویق اندختن آن نیست.** همیشه واکسن نزدن یا به تعویق اندختن بدون دلیل آن است!

- ابتلا به بیماری‌های خفیف مانند سرماخوردگی، اسهال خفیف یا تب مختصر
- مصرف داروهایی مانند آنتی بیوتیک‌ها
- نارس بودن نوزاد
- ابتلای کودک به سوء تغذیه
- ابتلای کودک به بیماری‌هایی مانند بیماری‌های قلبی، کلیوی، کبدی و ریوی (مثل آسم)
- حضور خانم باردار در منزل
- سابقه حساسیت خفیف در کودک یا بستگان وی
- بیماری‌های عصبی که تحت درمان بوده و کنترل شده‌اند (مانند صرع)
- ابتلا به زردی در دوره نوزادی
- تغذیه با شیرمادر

**همیشه از اقدامات خودسرانه و بدون مشورت متخصصین بهداشتی پرهیزید.** به شایعات و حرف دیگران توجه نکنید. با نزدن واکسن سلامتی کودک خود را به خطر می‌اندازید، اینمی بدن او را در برابر بیماری‌های خطرناک کم می‌کنید و او را در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می‌دهید. فقط با متخصصین بهداشتی مشورت کنید و واکسیناسیون را حتماً به موقع انجام دهید.



**نکته:**  
باید با ادامه واکسیناسیون به موقع علیه فلج اطفال، کشور را عاری از این بیماری نگه داریم و حق سلامت کودکانمان را به جا آوریم.

متاسفانه این بیماری هنوز در کشورهای افغانستان و پاکستان شایع است و خطر بازگشت مجدد بیماری به کشور و ابتلای کودکان وجود دارد. به همین خاطر وظیفه ما این است که با واکسیناسیون به موقع، سطح ایمنی کودکان مان را در بالاترین حد ممکن حفظ کنیم.

### واکسن‌های فلج اطفال کدام است؟

دو نوع واکسن برای پیشگیری از بیماری فلج اطفال وجود دارد:

**واکسن خوارکی فلح اطفال (قطره فلح اطفال):** از بدو تولد، قطره خوارکی فلح اطفال برای نوزادان تجویز می‌شود که باید برای ایجاد ایمنی کافی و دائمی،

### نکته:

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به مراکز بهداشتی درمانی یا خانه‌های بهداشت مراجعه نمایید و یا به وب سایت <http://iec.behdasht.gov.ir> مراجعه کنید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

**(III)**

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت بهداشت  
مرکزهایت باریهای و کیر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت بهداشت  
دفترآموزش و ارتقای سلامت

**(III)**



<http://iec.behdasht.gov.ir>

[www.behdasht.gov.ir](http://www.behdasht.gov.ir)

چند نوبت دیگر و به موقع تکرار شود. (به جدول واکسیناسیون مراجعه کنید)  
**واکسن تزریقی فلج اطفال:** در ۴ ماهگی یک نوبت واکسن تزریقی فلح اطفال همراه قطره خوراکی به کودکان تزریق می شود. این واکسن درواقع تضمین کننده حفاظت بیشتر کودکان در مقابل بیماری فلح اطفال و تقویت بیشتر ایمنی آنها است.



نکته:

واکسن تزریقی فلح اطفال هیچ عارضه مهم و نگران کننده ای ندارد و فقط در تعداد کمی از کودکان ممکن است باعث قرمزی، تورم و درد در محل تزریق شود.

نکته:

به طور کلی، دریافت هم زمان چند واکسن کاملاً بی خطر است و واکسن تزریقی فلح اطفال را می توان هم زمان با سایر واکسن ها تزریق کرد.

کسب اطلاعات درباره واکسن ها و واکسن فلح اطفال

پدر و مادر ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه واکسن به وب سایت <http://iec.behdasht.gov.ir> وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراجعه کنند یا با کارکنان بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت بصورت حضوری یا تلفنی مشورت نما يند.

