


شیوه زندگی سالم در میانسالان

(۳)

مضرات دخانیات و روش‌های ترک آن



معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دفتر سلامت جمیعت، خانواره و مدارس
کمیته کشوری کنترل استعمال دخانیات
اداره سلامت میانسالان

۹

ایقون زندگی بدون دخانیات

به نام خدا

استعمال دخانیات پدیده‌ای زیان بخش برای سلامت عمومی است و در حقیقت می‌توان آن را مهمترین آسیب برای سلامت عمومی دانست. مجموعه حاضر به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت میانسالان کمک می‌کند تا با مهمترین مواردی که در خدمات مشاوره برای ترک استعمال دخانیات مورد نیاز است، آشنا شده و موفقیت بیشتری در ارتقاء شیوه زندگی سالم گروه هدف کسب نمایند.

سیگار و بیماریها

تعداد مرگ‌های ناشی از سیگار کشیدن در ایران حدود ۵۰۰۰۰ مورد در سال تخمین زده می‌شود، که به طور چشمگیری بالاتر از سایر دلایل اختصاصی مرگ است. هزینه‌های بهداشتی (سلامتی) سیگار کشیدن نه تنها در کشورهای توسعه بافتنه، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز بالاست. با توجه به این حقیقت که زیان‌های بهداشتی ناشی از سیگار به موازات گسترش مصرف آن بیشتر می‌شود، تعجب‌آور نیست که بیماری‌های پدید آمده بر اثر سیگار در کشورهای در حال توسعه شایع‌تر است چرا که شیوع مصرف سیگار در این کشورها رو به افزایش است. همچنین سیگار کشیدن در بعضی زیر گروه‌های جمعیتی مثلًا زنان جوان در کشورهای توسعه یافته در حال افزایش است. سیگار کشیدن با مکانیسم‌های متعددی سبب بیماری می‌گردد. از میان شایع‌ترین بیماری‌هایی که با استعمال دخانیات در ارتباط است، بیماری‌های آتروواسکلروتیک قلبی عروقی، سرطانها، بیماری‌های مزمن انسدادی ریه، (COPD)، حملات مغزی، افزایش خطر پوکی استخوان، کاهش سن یائسگی در خانم‌ها، ناباروری و... را می‌توان نام برد. شواهد اپیدمیولوژیک ارتباط دهنده سیگار با این بیماری‌ها، معتر است. مهمترین این بیماری‌ها عبارتند از:


حمله مغزی

تمام سیگاریها در معرض خطر بیشتری از نظر ابتلا به سکته های مغزی هستند.

سرطان ریه

خطر ایجاد سرطان ریه حدود ۲۰ برابر در سیگاری‌ها بیشتر از غیرسیگاری‌هاست. در حقیقت سیگار کشیدن فاکتور خطر اصلی همراه با سرطان ریه است. خطر قابل استناد برای ایجاد سرطان ریه در زنان حدود ۷۹٪ و در مردان ۹۰٪ است. اکثر کسانی که بر اثر سرطان ریه می‌میرند، سیگاری هستند. خطر ایجاد سرطان ریه مستقیماً با تعداد سیگارهای کشیده شده در روز، مدت سیگار کشیدن و محتوای قطران و نیکوتین سیگارهای کشیده شده ارتباط دارد. در سیگاری‌های قهار، ۱۵ تا ۲۵ بار احتمال مرگ ناشی از سرطان ریه نسبت به غیرسیگاری‌ها بیشتر است. تنها گذشت ۱۵ تا ۲۰ سال از شروع سیگار کشیدن کافی است تا سرطان ریه ایجاد شود و تعداد کمی از بیماران مبتلا به آن بیش از ۵ سال پس از تشخیص زنده می‌مانند. خطر سرطان ریه بین سیگاری‌های غیرفعال یا تحملی نیز افزایش یافته است. شواهد تجربی بسیاری نقش دود سیگار را در سرطان ریه نشان داده‌اند.

بیماریهای قلبی عروقی



سیگار کشیدن همچنین یک عامل خطر اصلی برای ایجاد بیماری‌های قلبی عروقی است. در حقیقت تأثیر سیگار از نظر میزان، مشابه دو عامل خطر اصلی دیگر، یعنی فشار خون و هیپرکلسترولمی است. اما از دیدگاه بهداشت عمومی، شیوع بیشتر سیگار کشیدن از هیپرکلسترولمی یا هیپرتانسیون، عامل خطر مهمتری نسبت به هر دو آنهاست.

در اینجا نیز سیگاری‌های قهار در معرض خطر بیشتری هستند. سیگار کشیدن می‌تواند با مکانیسم‌های مختلف سبب ایجاد بیماری‌های قلبی مزمن گردد، از جمله: صدمه مستقیم اندولیال به

وسیله نیکوتین و منوکسیدکربن که می‌تواند دیواره یک شریان طبیعی و باز را تخریب کند و موجب ورود مواد خارجی به داخل دیواره رخمه و ضخیم شدن و تنگی و در نهایت انسداد کامل شریان گردد. افزایش ضربان قلب و فشار خون به واسطه آزادسازی کاته‌کولامینها، هیپرلیپیدمی، افزایش میزان LDL، افزایش نوتروفیلهای در گردش، و افزایش نیاز به ۰۴۰۰ عضله قلبی شده و از سوی دیگر ظرفیت حمل اکسیژن توسط خون را کاسته، سبب تشدید ناتوانی و اختلال عملکرد قلب می‌گردد و به این ترتیب زمینه را برای بروز آریتمی‌های قلبی مستعد می‌کند. عضله قلب تنها زمانی سالم باقی می‌ماند که یک جریان خوب توسط شریان‌های کرونر به آن برسد. در طی سالهای زندگی و به منزله بخشی از فرآیند طبیعی بیری، این عروق به تدریج به علت فرآیند دژنراتیو، دیواره شان تنگ می‌شود. در سیگاری‌ها این فرآیند بسیار سریع تر از افراد طبیعی پیش روی می‌کند. کرارآخون جریان یابنده از خلال این عروق تنگ به طور ناگهانی لخته می‌شود (ترومبوز کرونر) و به طور جدی به عضله قلب آسیب می‌رساند. ترومبوуз کرونر علت شایع مرگ در مردان و زنان بین سنتین ۳۵-۶۴ سال است.

بیماری عروق کرونر با تعداد سیگارهای کشیده شده، درجه استنشاق و سن شروع سیگار کشیدن در ارتباط است.



۳

۲

به نظر می‌رسد که تعدادی از مکانیسم‌های متقابل در پاتوژن COPD ناشی از دود سیگار موثر باشند. ظاهراً آمفیزم ناشی از تحریب ریه است که خود می‌تواند از صدمه مستقیم دود سیگار، اکسیدانهای القاء شده و یا تولید مواد واسطه‌ای التهابی جدید به دلیل تماس با دود پدید آمده باشد. به نظر می‌رسد که برونشیت مزمن ناشی از مکانیسم‌های مشابه در راه‌های هوایی است.

مواد موجود در دود سیگار

هر نوع سیگاری که کشیده می‌شود، شامل توتون، کاغذ، اسانس، چسب، گوگرد و مواد نگهدارنده است. درجه حرارت آتش سیگار حدود ۹۰۰ درجه سانتی گراد است. در این درجه حرارت، عمل «شکست حرارتی» انجام می‌شود؛ یعنی ترکیبات مختلف، تغییر ساختمان می‌دهند. حرارت سیگار در داخل دهان به حدود ۳۰ درجه سانتی گراد می‌رسد. دود سیگار دارای دو جریان اصلی و کناری است، جریان اصلی دودی است که پس از پک زدن به سیگار از بدنه سیگار عبور و به دهان و ریه داخل می‌گردد. جریان کناری دودی است که از نوک مشتعل سیگار خارج و وارد محیط می‌شود و توسط فرد سیگاری و اطرافیان سیگاری وی استنشاق می‌شود. دود سیگار شامل ۴۰۰۰ ماده شیمیائی است که از این میان بیماری‌زاوی ۴۰۰ ماده و سرطان‌زاوی ۴۰ ماده به ابتدا رسیده است.



بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)

سیگار کشیدن عامل خطر اصلی همراه با بیماری انسدادی مزمن ریه است. مواد محرک دود تنباکو (قطران و گازسیانید) مسئول بروز برونشیت و آمفیزم هستند. این محرک‌ها عمل مژک‌ها را که وظیفه پاک ساختن ریه‌ها از مواد آلینده دارند متوقف می‌سازد. آنها همچنین سبب ترشح بیشتر موکوس توسط غدد برونشی می‌شوند. وقتی که مژک‌ها غیرفعال می‌شوند، به اجبار فرآیند پاکسازی ریه‌ها از موکوس اضافی، قطران و سایر ناخالصی‌ها باید از راه سرفه کردن انجام شود. سیگاری‌ها بیشتر از غیرسیگاری‌ها سرفه می‌کنند و خلط بیشتری تولید می‌کنند. سایر علائم تنفسی شامل کوتاهی تنفس، سنگینی سینه، خس‌خس، درد سینه، سینوزیت‌های مکرر و سرماخوردگی‌های مکرر است. تقریباً تمام بیماران مبتلا به آمفیزم بالینی واضح سیگاری هستند. سیگار همچنین یک عامل خطر مهم برای ایجاد برونشیت مزمن است. سیگاری‌های قهار در معرض خطر بیشتری برای ایجاد COPD نسبت به سیگاری‌های متوسط هستند، اما در معرض مقادیر کم دود سیگار بودن چنان که در سیگار کشیدن تحمیلی دیده می‌شود نیز زیان آور به نظر می‌رسد.



دود سیگار شامل دو بخش است :

بخش گازی

بخش گازی ۸۵٪ دود سیگار را شامل می شود و اکثر آن اکسیژن، نیتروژن و اکسیدکربن تشکیل می گردد. مهمترین مواد بخش گازی شامل :

الف) مونو اکسید کربن (CO)

این ماده میل ترکیبی زیادی با هموگلوبین خون دارد. در رقابت با اکسیژن برای ترکیب با هموگلوبین پیروز می شود و در نتیجه، انتقال اکسیژن به بافتها کاهش می یابد. بدین برای جبران کاهش اکسیژن بافتی، تعداد سلولهای رساننده اکسیژن (گلوبولهای قرمز) به بافتها را افزایش می دهد و در نتیجه پلی سیتمی (افزايش غلظت خون) به وجود می آيد.

ترکیب CO و هموگلوبین در افراد طبیعی ۱٪ و در سیگاری ها ۵ تا ۱۵٪ است . افزایش سطح ترکیب مونو اکسید کربن با هموگلوبین و کاهش اکسیژن رسانی بافتی ناشی از آن سبب خستگی زودرس، کاهش قدرت عضلانی، عوارض پوستی و عوارض عصبی می گردد. سیگارهای معمولی ۱۲ تا ۱۸ میلی گرم، سیگارهای سبک ۸ تا ۱۲ میلی گرم، و سیگارهای بسیار سبک کمتر از ۸ میلی گرم، CO دارند.

سیلیوتوكسینها یا سموم مژکی

مخاط مجاری تنفسی با سلولهای مژکدار پوشیده شده است که وظیفه آنها پاکسازی مجاری تنفسی از گرد و غبار و مواد آلاینده راههای تنفسی است.

سموم موجود در دود سیگار سبب فلچ شدن این مژکها و اختلال در عمل پاکسازی ریه می گردد و به ناجار سیستم تنفسی برای پاکسازی خود از مواد زاید به سرفه متول گشته، این مواد را با خلط خارج می کند.

۱- بخش گازی ،

ماده	ادر
مونوکسید کربن	کاهش انتقال اکسیژن
اسید هیدرو سیانید	سموم مژکی
آکرولین	سموم مژکی
فرمالدئید	سموم مژکی
اکسید نیتروژن	سموم مژکی
هیدرازین	سرطان زا
ونیل کلراید	سرطان زا
نیتروزامین	سرطان زا

۲. بخش ذره ای

ماده	ادر
قطران	سرطان زا
هیدروکربن حلقوی	سرطان زا
نیکوتین	اعتداد آور - محرك
فنل	سرطان زا
کرزول	سرطان زا
بنزوپیرن	سرطان زا
ایندول	سرطان زا
کاتکول	سرطان زا
نیکل ارسنیک	سرطان زا

بخش ذره ای


نخستین کاشفان اروپایی، استفاده از گیاه تنباقو را از بومیان آموختند و در اواسط قرن هفدهم، مصرف تنباقو به طور گسترده در اروپا رواج یافت. نیکوتین، ماده دارویی موجود در برگهای تنباقوست. این آلkaloid مخصوص متabolیک اصلی گیاه تنباقوست. نیکوتین به واسطه تحریک گیرنده های ویژه در نقاط مختلف بدن، آثار متعددی بر روی سیستمهای مختلف داخلی می گذارد. سیگارهای معمولی بین $1-1/5$ mg (میلی گرم)، سیگارهای سیک $1-1/5$ mg + و سیگارهای بسیار سیک کمتر از $1/5$ mg نیکوتین دارند.

الف) سیستم اعصاب محیطی

اثر نیکوتین بر سیستم اعصاب محیطی در ابتدا تحریک و سپس در صورت مصرف مداوم سرکوب این سیستم است. مقادیر کم نیکوتین مستقیماً سلوهای عصبی را تحریک و انتقال پیامهای عصبی را تسهیل می کند، اما در مرحله بعد نیکوتین سبب سرکوب انتقال پیامهای عصبی می گردد. از سوی دیگر نیکوتین سبب آزاد شدن موادی از بخش مرکزی غده فوق کلیه به نام کاتکولامین می گردد که آزادسازی آنها، افزایش ضربان قلب و فشار خون را در پی دارد.

ب) سیستم قلبی - عروقی

نیکوتین در این سیستم سبب افزایش ضربان قلب و فشارخون می گردد که ناشی از تحریک سیستم عصبی محیطی و بخش مرکزی غده فوق کلیوی و آزادسازی کاتکولامینهاست.



۹

بخش ذره ای 15% دود سیگار را شامل می شود. این ذرات به اندازه $1/5$ میکرون هستند و در هر میلیمتر مربع حدود سه میلیارد ذره وجود دارد که تا بخشهای انتهایی ریه می رسد. مهمترین مواد بخش ذره ای شامل نیکوتین و قطران (Tar) است. نیکوتین ماده موثر و اصلی دود سیگار است که خواص اعتیادزا بی، آثار قلبی عروقی، سیستم عصبی و ... دارد.

در بخش ذره ای وجود بیش از 40 نوع ماده سرطان زا ثابت شده است. این مواد شامل هیدروکربن های چند حلقه ای، تار یا قطران، فنل، کرزول، ایندول، کاتکول و غیره اند. محتوای قطران در سیگارهای بدون فیلتر بیش از $18mg$ سیگارهای معمولی 12 تا 18 mg، در سیگارهای سیک 8 تا $12mg$ و در سیگارهای بسیار سیک کمتر از 8 mg است.

نیکوتین

بومیان قاره آمریکا در دوران باستان استفاده از گیاه تنباقو را کشف کردند. هنگامی که کریستف کلمب به آمریکا رسید، استفاده از تنباقو در نیمکره غربی گسترش یافته و جزئی از فرهنگ امریکائیهای بومی شده بود. در آن زمان، تولید و تجارت تنباقو فعالیت اقتصادی مهمی در بین امریکائیهای بیش از کلمب بود.



۸

پ) سیستم اعصاب مرکزی

را به طور سیستمیک در اختیار فرد سیگاری قرار می‌دهد. میزان در دسترس بودن نیکوتین بسته به شدت پکها و تکنیک سیگار کشیدن افراد افزایش می‌باید و تقریباً ۸۰-۹۰ درصد نیکوتین در بدن به خصوص در کبد و همچنین در کلیه و ریه صورت می‌پذیرد و جزء مهمی از نیکوتین استنشاق شده به وسیله ریه متabolیزه می‌شود. سرعت متabolیسم نیکوتین در فرد سیگاری و غیرسیگاری یکسان است. نیمه عمر نیکوتین متعاقب استنشاق یا استفاده غیرخوارکی، حدود دو ساعت است. نیکوتین و متabolیت‌هایش هر دو به سرعت توسط کلیه جذب می‌شوند و سرعت دفع ادراری آنها با میزان اسیدیته ادرار در رابطه است و وقتی ادرار قلیائی است، میزان دفع آن کاهش می‌باید. نیکوتین در شیر زنان شیرده دفع می‌شود، شیر سیگاریهای قهار ممکن است دارای ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر نیکوتین باشد.

سمومیت حاد نیکوتین

شروع علائم حاد و شدید مسمومیت نیکوتین سریع است و شامل: تهوع، استفراغ، ترشح بzac، درد شکم، اسهال، عرق سرد، سردرد، گیجی، اختلال شنوایی و بینایی، تیرگی شعور و ضعف واضح است. مسمومیت حاد نیکوتین سبب افت فشار خون، تنفس مشکل، نیض ضعیف، تند، نامنظم و در نهایت تشنج، نارسایی تنفس و در آخر، مرگ می‌گردد. مقدار کشنده حاد نیکوتین در یک فرد بالغ احتمالاً حدود ۶۰ میلی‌گرم پایه است.

اعتیاد به نیکوتین:

شما معتاد به ماده نیکوتین شده‌اید اگر:
- روزانه بیش از ۱۰ سیگار می‌کشید.
- کمتر از ۳۰ دقیقه پس از بیدار شدن از خواب سیگار می‌کشید.
- با ترک سیگار دچار علائمی از قبیل: اشکال در تمرکز، سردرد و سرگیجه، اختلال خواب، سوء هاضمه، لرزش و تعریق، تندخوبی و اضطراب می‌شوید.
در این صورت باید هرچه سریع‌تر برای ترک اقدام کنید.

11

نیکوتین به وضوح سبب تحریک سیستم عصبی مرکزی (شامل مغز و ضمایم آن) می‌گردد. مقادیر محدود نیکوتین ایجاد لرزش می‌کند و مقادیر بیشتر آن تشنج به دنبال دارد. از سوی دیگر، نیکوتین با اثر بر بصل النخاع موجب تحریک تنفس می‌گردد و اثر سرکوبی متعاقب آن، منجر به سرکوب مرکز تنفسی ناشی از هر دو فلچ مرکزی و انسداد محیطی عضلات تنفسی و در نهایت نارسایی تنفسی و مرگ می‌شود. نیکوتین با اثر گذاشتن بر روی مرکز بصل النخاعی و تحریک محیطی سیستم عصبی واگ، سبب القای حالت تهوع و استفراغ می‌گردد. در فرد غیرسیگاری این حالت حتی با مقادیر کم نیکوتین القا می‌گردد، اما در فرد سیگاری در صورتی که سطح نیکوتین خون به بالاتر از میزان همیشگی برسد این حالت ایجاد می‌شود.

ت) دستگاه گوارش

نیکوتین با اثرگذاری بر اعصاب موجود در دستگاه گوارش باعث افزایش قوام و فعالیت حرکتی روده می‌گردد. حالتهای تهوع، استفراغ و معمولاً اسهال متعاقب جذب عمومی نیکوتین در فردی که قبلاً در معرض نیکوتین قرار نگرفته است، دیده می‌شود.

ث) غدد برون ریز

نیکوتین موجب تحریک اولیه ترشحات بzacی و برونشی می‌گردد

جذب، متabolیسم و دفع

نیکوتین به سهولت توسط درخت تنفسی، غشاء‌های دهانی و پوست جذب می‌گردد. جذب نیکوتین از معده محدود است، مگر اینکه PH داخل معده افزایش یافته باشد. جذب روده‌ای تأثیر بیشتری دارد، نیکوتین موجود در تنباکوی جویدنی به سبب اینکه بسیار آهسته تر از نیکوتین استنشاقی جذب می‌گردد مدت زمان تأثیر بیشتری دارد. سیگاریهای معمولی ۸-۹mg نیکوتین مصرف می‌کنند که حدود mg ۱ نیکوتین

10

اگر نگران افزایش وزن خود پس از ترک سیگار هستید، لازم است به نکات زیر توجه کنید:

- متوسط افزایش وزن بیشتر از ۲.۴ کیلوگرم نخواهد بود.
- با انجام تمرینات بدنی این افزایش وزن قابل کنترل است.
- مضرات کشیدن سیگار با افزایش مختصر وزن قابل مقایسه نیست.
- لطمہ ظاهری کشیدن سیگار (بوی بد تنفس، بوی بد لباس، رنگ تیره پوست و مخاط، رنگ زرد دندان) با اثر ظاهری افزایش مختصر وزن قابل مقایسه نیست.
- نیاز به گرفتن رژیم غذایی در دوره ترک نیست و می‌توان آن را به بعد موکول کرد.

کام اول - آمادگی

در این مرحله باید یک هفته در نحوه سیگار کشیدن خود دقت کنید. زمان، مکان، علت و احساس سیگار کشیدن خود را بشناسید و این اطلاعات را روی یک کارت یادداشت کنید.

الف - چرا سیگار می کشید؟

برای سیگار کشیدن دلایل زیادی وجود دارد، ولی اغلب سیگاری‌ها یکی از این دلایل را ذکر می کنند:

- سیگار کشیدن انرژی زاست؛
- سیگار کشیدن لذت بخش است؛
- سیگار کشیدن اعتیاد است؛
- سیگار کشیدن عادت است؛
- سیگار کشیدن بدون دلیل است؛

ب - علت ترک سیگار

دلایل ترک سیگار خود را بر روی یک کارت دیگر نوشته و همیشه به آن فکر کنید.

ترک سیگار



ترک سیگار مهمترین قدمی است که برای سلامت خود برمی‌دارید.

فواید ترک سیگار:

سیگار شایع ترین علت قابل پیشگیری مرگ است.

- افرادی که روزی دو بسته سیگار می‌کشند، اگر سیگار را ترک کنند، به طور متوسط میزان مرگشان از بیماری قلبی و عروقی و سرطان ریه ۴ سال به تعویق می‌افتد.

- یک سال پس از ترک، فراوانی خطر بیماری کرونر قلب ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

- ترک سیگار سریعاً سطح منواکسید کربن را در خون کاهش می‌دهد.

- تولید خلط، سرفه و تنگی نفس با ترک سیگار سریعاً کاهش می‌یابد.

- تحریک گلو از بین می‌رود.

- حس بویایی و چشایی فرد افزایش می‌یابد.

- حس اعتماد به نفس را بالا می‌برد.

- چین و چروک صورت را کاهش می‌دهد.

- وضع تنفس بهتر می‌شود.

- در مادران باردار با ترک سیگار، خطر سقط خوبخودی، جفت سرمه‌ای، نوزاد نارس و نوزاد با وزن تولد پایین و سایر عوارض بعد از تولد را کاهش می‌یابد.

- با ترک سیگار احتمال حمله قلبی یا سکته مغزی، ابتلا به سرطان، بیماری مزمن تنفسی، بیماری‌های دهان و دندان کاهش می‌یابد.

ج - انتخاب تاریخ ترک

این مرحله بسیار مهم است. بر روی تقویم، یک روز خاص را علامت بگذارید. زمان زیاد دوری را انتخاب نکنید. بهترین زمان همین الان است.


از همین حالا ترک کنید زیرا:

- با کشیدن هر سیگار ۵/۰ میلی گرم نیکوتین وارد بدن می شود پس از همین حالا ترک کنید.

• اکثر آسیب‌های سیگار پس از ترک قابل برگشت هستند و مرگ و میرکلی ۱۰-۱۵ سال پس از ترک، مشابه افراد غیرسیگاری است.

• برای ترک سیگار بسته به انگیزه شما برای سیگار کشیدن راههای مختلفی وجود دارد. در اولین فرستاد برای استفاده از این تکنیک‌ها به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.

د - انتخاب روش ترک



د- روش شخصی

شامل ترک یکباره و ترک تدریجی است. در ترک یکباره که در مورد اغلب افراد موفقیت آمیز است، در روز ترک به صورت ناگهانی و کامل سیگار کشیدن را متوقف می کنند. در ترک تدریجی که برای افرادی که به نیکوتین وابسته شده اند روش بهتری است، کم کردن تعداد سیگار مصرفی روزانه تا حدود ۵ عدد در روز به تدریج و در طول یک مدت مشخص انجام می شود. این روش به زمان بیشتری نیاز دارد.

۱۴

د-۲- روش مداخله پژشک

مشورت با پژشک بسیار سودمند است. در مورد ضررهاهی سیگار و بیماری‌ها می‌توان آموزش دید. باید از توصیه‌های علمی استفاده کرد و روش‌های ترک جایگزین نیکوتین و روان درمانی و گروه درمانی را با برنامه مشخص انجام دادروان درمانی شامل یک سری توصیه‌های رفتاری و عملکردی ساده است. این توصیه‌ها برایه علت سیگار کشیدن است که از طریق انجام تست «چرا سیگار می کشید؟» مشخص می‌شود. جایگزین نیکوتینی، شامل استفاده از قرص مکینکی، آدامس و برچسب نیکوتینی است. گروه درمانی، شامل استفاده از روش‌های مختلف ترک به صورت دسته جمعی و بحث عمومی است. آمار و نتایج مشخص ساخته است که روش مداخله پژشک مفیدتر است.



۵ - تغییر نحوه سیگار کشیدن

این مرحله بسیار کمک کننده خواهد بود. زمان و مکانهای عادی و همیشگی سیگار کشیدن را تغییر دهید. موقتاً در خانه یا اتومبیل سیگار نکشید. در محلهایی که احساس راحتی می کنید سیگار نکشید. سیگار را در نیمه آن خاموش کنید.

کام دوم - ترک سیگار

الف - روز ترک

در روز خاصی که انتخاب کرده‌اید، با استفاده از روشی که انتخاب کرده‌اید، سیگار را ترک کنید و به خود القا کنید که از این پس سیگار نخواهید کشید. به خود نگویید: «در تلاش هستم سیگار را ترک کنم»، بلکه خود را یک غیرسیگاری بدانید و بزودی چنین خواهد شد.

۱۵

۱۳

ب) آشنایی با سندروم ترک

بعد از ترک سیگار احتمال دارد عوارض خاصی برای فرد به وجود آید که با شناختن آنها می‌توان به راحتی آن را تحمل و درمان کرد.

علائم سندروم ترک سیگار و درمان			
روش درمان	مدت	علت	علامت
دقت در تغییر وضعیت	تا چند روز	اکسیژن بیشتر	سیگار سر
مایعات زیاد، حمام گرم	تا چند روز	فعالیت مزکھا	خشکی سینه
قدم زدن، حمام گرم	تا ۱ هفته	کاهش نیکوتین	بی قراری
استراحت و چرت زدن	از ۱ تا ۲ هفته	کاهش نیکوتین	کسالت
نخوردن چای و قهوه از ساعت ۶ عمر	تا ۱ هفته	کاهش نیکوتین	بیخوابی
مایعات زیاد، غذا با فیبر زیاد	از ۱ تا ۴ هفته	کم کاری روده	نفخ و بیوست
مایعات زیاد، غذا با کالری کم	از ۱ تا ۴ هفته	افر نیکوتین	گرسنگی
مایعات زیاد، استراحت	از ۱ تا ۲ هفته	اکسیژن بیشتر	سردرد
عدم تمرکز	از ۱ تا ۳ هفته	افر نیکوتین	پاقی
ورزش - رژیم	از ۱ تا ۴ هفته	افزایش گرسنگی	



قام سوم زندگی پس از ترک سیگار

الف - پیشگیری از عود

ترک سیگار کسب یک مهارت است که مانند کسب هر مهارت دیگری ممکن است برای بار اول با موفقیت توان نباشد. کمتر از ۲۵ درصد افراد در اولین تلاش خود برای ترک موفق هستند. اغلب افراد ۳۴ بار باید کوشش کنند.

پس مراقب عود باشید:

اگر سیگار کشیدن را ترک کرده‌اید، توجه داشته باشید که شرایط زیر مساعد کننده عود و عدم موفقیت ترک هستند. از این شرایط پرهیز کنید و راه‌های سازش یا مقابله با آنها را بیاموزید:

- همنشینی با سیگاری‌ها
- سبک زندگی پر استرس و تحت فشار قرار گرفتن

۱۷

ج - کنترل هوش سیگار

هنگام میل شدید به سیگار، از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید:

- تاخیر: برای روشن کردن سیگار چند دقیقه وقفه ایجاد کنید. از ساعت زنگدار می‌توان استفاده کرد.
- تنفس عمیق: سه بار نفس عمیق بکشید و سپس آهسته تنفس کنید.
- نوشیدن: یک لیوان آب یا نوشیدنی کم کالری مصرف کنید.
- انحراف: به جای سیگار کشیدن عمل دیگری مثل روزنامه خواندن، جدول حل کردن و قدم زدن انجام دهید.
- یادآوری: به دلایل ترک سیگار و ضررهای سیگار فکر کنید.
- تک تک شرح دادن: به طور جداگانه موقعیتهای هوش برانگیز را نام برد، در مورد راههای مقابله با هر یک فکر کنید.

۱۸

نکاتی درباره قلیان:

برخلاف بسیاری عقاید و باورهای سنتی، دود منتشره از قلیان حاوی مقادیر بسیاری مواد سمی می‌باشد.

این مواد بعنوان عوامل اصلی بروز سرطان ریه، بیماری‌های قلبی عروقی و سایر بیماری‌ها شناخته شده‌اند.

نیکوتین حاصل از دود قلیان همانند سایر مواد دخانی اعتیادآور است. مصرف کنندگان قلیان در هر بار مصرف دود بسیار زیادی را در مقاسه با کشیدن یک نخ سیگار دریافت می‌کنند. با وجود اینکه بخشی از نیکوتین موجود در دود قلیان در اثر عبور از آب جدا می‌شود، میزان نیکوتین دریافتی در افراد مصرف کننده قلیان به اندازه‌ای است که ایجاد وابستگی می‌کند.

افراد سیگاری به طور متدالو ۸ تا ۱۲ نخ سیگار در روز مصرف می‌کنند و به طور متوسط با ۴۰ تا ۷۵ پک در روز حدود ۰/۵ تا ۰/۶ لیتر دود استنشاق می‌کنند.

این درحالی است که مصرف کننده قلیان در هر وعده مصرف که به طور متدالو ۲۰ تا ۸۰ دقیقه طول می‌کشد، حدود ۵۰ تا ۲۰۰ پک می‌زند و هر یک پک حاوی ۰/۱۵ تا یک لیتر دود می‌باشد. به عبارت دیگر از نظر مواجهه و استنشاق دود هر فرد مصرف کننده قلیان در هر وعده معادل ۱۰۰ نخ یا بیشتر سیگار، دود دریافت می‌کند.

همچنین با توجه به اینکه توتون و تنبکوی استفاده شده در قلیان از نازلترين و پستترین توتون و تنبکوهای موجود است که خطرات آن بیشتر است و انسانس‌ها و عطرهای استفاده شده در تنبکوهای معلسل یا میوه‌ای حاوی هزاران ماده سمی و کشنده است. مصرف کنندگان قلیان و اطرافیان آنها که در معرض دود تحمیلی آن قرار دارند همچون مصرف کنندگان سیگار مبتلا به انواع سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی عروقی، تنفسی و اثرات سوء آن بر بارداری خواهند شد.

- جر و بحث کردن

- مصرف الکل یا قهوه

- مشکل خواب یکی از علائم ترک است. تنها زمانی که خسته هستید

به رختخواب بروید

- عدم فعالیت بدنی

علاوه بر روش‌های یاد شده باید توصیه‌های زیر را نیز به کار بست:

● با افکار منفی مبارزه کنید. «ترک سیگار کار سختی است»، « فقط یک سیگار ضرری ندارد» و امثال این افکار را از خود دور کنید. مثبت و قوی باشید.

● استفاده از راههای جدید برای کسب آرامش:

۱- استراحت در محل راحت و بستن چشمها؛

۲- تنفس عمیق؛

۳- کشیدن دستها و پاها برای چند ثانیه؛

۴- فکر کردن به مناظر دلپذیر و محلهای مطبوع

● قدم زدن، ورزش کردن و رفتن به پارک بسیار مفید است.

● حمایتهای اجتماعی کسب کنید: تماس با دوستان،

صحبت با افراد فامیل در مورد ترک سیگار و

● اجتناب از موقعیتهای خطر آفرین مثل حضور در میهمانی افراد سیگاری، بویژه در اوایل دوره ترک سیگار.

● کارت «دلایل ترک و ضررها سیگار» خود را در نقاط مختلف منزل و در معرض دید قرار دهید.

● استفاده از غذاهای کم کالری یا نوشیدنیهای کم کالری هنگام تمايل به سیگار.

● قرار دادن قلم یا خودکار بین انگشتان دست به جای سیگار.

● در صورتی که دچار لغزش شدید و یک سیگار کشیدید مجدد سیگاری نمی‌شوید. با تفکر مثبت و بررسی مجدد دلایل ترک خود، بار دیگر برنامه ترک سیگار را شروع کنید.

میزان منواکسید کربن، فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی سلطان‌زا منشره از اختراق ذغال و یا مواد ایجاد‌کننده حرارت در قیان در مقایسه با سیگار به مراتب بیشتر از اثرات سوء آن، چه برای مصرف کننده و چه افراد در معرض دود تحمیلی، فراتر می‌باشد.

علاوه بر موارد فوق بیماری‌های منتقله از طریق دهان، دندان و دستان آنوده در اثر استفاده مشترک از قیان بر عوارض ناشی از مصرف قیان می‌افزاید.

مطلوب این مجموعه توسط:

دکتر حسن آذری‌پور – دکتر مفهوره عالمه – مهندس خدیجه فریدون محصلی
تهیه و تدوین شده است.