

این بیماری در خانم‌ها اغلب بدون علامت است. در آقایان ترشحات غلیظ و چرکی از ماجرا به همراه سوزش و احساس ناخوشی در مجرای ادراری علامت بارز هستند که معمولاً ۱-۱۴ روز پس از تماس جنسی با فرد آلوده ایجاد می‌شوند. این بیماری با آنتی‌بیوتیک درمان می‌شود و درمان شریک جنسی به همراه درمان خود فرد ضروری می‌باشد. عوارض این بیماری در صورت عدم درمان عبارتند از:

- ۱- عفونت پیضدها
- ۲- تنگی مجرای ادراری آقایان
- ۳- عفونت لوله‌های رحمی و تحملدان‌ها در خانم‌ها و ناباروری
- ۴- عفونت کلامیدیا: کلامیدیا یک نوع میکروب (باکتری) بوده و از شایع‌ترین علل بیماری‌های آمیزشی عفونی محاسب می‌شود اغلب بیماران مذکور یا مونث بی‌علامت هستند (بیماری خاموش). در حدود نیمی از مردان مبتلا به عفونت کلامیدیایی علامت ادراری مانند سوزش و تکرر ادرار و خروج ترشحات شفاف و بی‌رنگ از مجرأ دارند. معمولاً عفونت کلامیدیا با سوزاک همراه است و باید همراه سوزاک این بیماری نیز درمان شود. در خانم‌ها این عفونت می‌تواند موجب عفونت شدید لوله‌های رحمی شده و موجب ناباروری شود.
- ۵- تبخال تناسلي: عامل ایجاد کننده آن یک نوع ویروس می‌باشد بنام ویروس نوع ۲ تبخال (نوع یک ویروس در اطراف دهان ایجاد تبخال می‌کند). انتقال آن بسیار سریع بوده و حتی پس

در ناحیه تناسلي، درد کشاله ران و اطراف دستگاه تناسلي، درد حین نزدیکی و ... علامت این بیماری‌ها در مردان شامل ترشح از مجرای ادرار، بزرگ شدن عقده های لنفاوی کشاله ران، زخم ناحیه تناسلي، درد و سوزش هنگام دفع ادرار و ... می‌باشد.

در صورت بروز هرگونه علامت غیرطبیعی در پوست ناحیه تناسلي، اطراف مجرای ناحیه تناسلي و یا ترشح از مجرای ادراری باید فوراً به پزشك مراجعه نمایند. حتماً تماس جنسی مشکوک خود را به پزشك اطلاع دهید تا تشخیص و درمان شما آسان گردد.

-چگونه می‌توان این بیماری‌ها را تشخیص داد؟

راه تشخیصی این بیماران معاینه توسط پزشك، آزمایش ترشحات و در صورت لزوم آزمایش خون و ادرار می‌باشد.

-همه‌ترین بیماری‌های آمیزشی کدامند؟
شایع‌ترین بیماری‌های آمیزشی عبارتند از سوزاک، عفونت کلامیدیا، تبخال تناسلي، زگیل تناسلي، سیفیلیس و شانکروئید. برخی از بیماری‌های مهم مانند هپاتیت ب و ایدز علاوه بر انتقال از راه خون، از طریق جنسی نیز می‌توانند منتقل شوند.

-سوزاک: این بیماری در اثر یک باکتری (میکروب) بنام گونوک ایجاد می‌شود. به علت ایجاد سوزش شدید در مجرای آقایان به این نام مشهور شده است.

-بیماری‌های آمیزشی چیستند و در چه کسانی ایجاد می‌شوند؟

بیماری‌های آمیزشی جنسی، از بیماری‌های نسبتاً شایعی هستند که از شخصی به شخص دیگر به دنبال تماس جنسی منتقل می‌شوند. اغلب نوجوانان و جوانان که از نظر جنسی فعال هستند به این بیماری مبتلا می‌شوند.

-علت ایجاد بیماری‌های آمیزشی چیست؟
علت ایجاد بیماری‌های آمیزشی باکتری یا ویروس‌هایی هستند که از طریق پوست و ترشحات مجرای تناسلي از فردی به فرد دیگر در طی فعالیت جنسی منتقل می‌شوند و باعث ایجاد علایم موضعی و عمومی در بدن می‌شوند.

بیماری‌های آمیزشی عفونی دو دسته هستند: دسته‌ای که تنها راه انتقال آنها تماس جنسی است و دسته‌ای که یکی از راه‌های انتقال آنها تماس جنسی می‌باشد (مانند هپاتیت ب و ایدز).

-بیماری‌های آمیزشی چه علائمی را ایجاد می‌کنند؟

بیماری‌های آمیزشی در هر دو جنس مذکور و مونث ایجاد می‌شوند ولی علامت و عوارض آنها در دو جنس متفاوت است.

علامت این بیماری‌ها در خانم‌ها عبارتند از: ترشحات بدبو و غیرمعمول از دستگاه تناسلي، سوزش و خارش و ضایعات زخمی

بیماری‌های آمیزشی



انجمن اورولوژی ایران



دفتر سلامت جمیعت، خانواده و مدارس
معاونت سلامت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شیوع آن نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است.
علامت آن به صورت زخم بدون درد بر جسته در
پوست ناحیه تناسلی و کشاله ران می‌باشد که معمولاً
چند هفته پس از تماس جنسی دیده می‌شود.

در صورت عدم درمان می‌تواند عاقبت جیران
ناپذیری به همراه داشته باشد (مانند علامت متشر
پوستی، عفونت مغزی و تشنج، عفونت دریچه‌های
قلبي، فلنج اندام‌ها، آسیب بینایي و ...).

۶- شانکروئید: (زخم دردناک ناحیه تناسلی) عفونت
ناشی از باکتری است که به صورت دردناک در ناحیه
تناسلی همراه با ترشحات چرکي زرد رنگ از بستر
زخم ظاهر می‌نماید (شکل ۴). معمولاً در این
بیماری عقده‌های لفاوي کشاله‌ران همان طرف
بزرگ و دردناک می‌شوند. درمان دارويی باعث
بهبودی كامل اين بیماری می‌شود.

در اکثر بیماری‌های آمیزشی درمان همسر یا شريک
جنسی نيز ضرورت دارد.

- راه‌های جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های آمیزشی
چیستند؟

بهترین راه پیشگیری اين بیماری‌ها پاییندي به اصول
اخلاقی و روابط خانوادگی و پرهیز از روابط جنسی
مشکوك و پرخطر می‌باشد.

- هنگام تماس جنسی با افراد مشکوك به آلدگي از
وسائل حفاظتى مانند کاندوم استفاده شود.

- از روابط جنسی با افراد متعدد اجتناب شود.

- در صورت مشاهده هرگونه علامت غير طبیعی در
ناحیه تناسلی مانند زخم در شريک جنسی از تماس
پرهیز شود.

از يكبار تماس جنسی با افراد آلوده انتقال
صورت می‌گيرد.

علامت آن به صورت تاول‌هاي ريز آبدار پوستي
دردناک در کنار هم که سوزش و خارش دارند
می‌باشد اين تاول‌ها در ناحیه تناسلی و گاهی
داخل یا لبه خروجی مجرای ادراري دیده می‌
شوند که باعث سوزش هنگام ادرار کردن می‌
شود.

بیماری برای هميشه در بدن شخص مبتلا
باقيمانده و باعث آلدگي شريک جنسی می‌
گردد. در صورت ابتلای خانم حامله به اين
بیماری در صورت انجام زايمان طبیعی بیماری
متشر و خطرناکی در نوزاد ایجاد می‌شود که
ممکن است کشنده باشد.

۴- زگيل تناسلي: عامل آن ويروس است که از
طريق تماس جنسی منتقل و به صورت
برجستگي گوشتي قارچي شكل در ناحيه
تناسلی ظاهر می‌شود. در صورت ابتلا فرد تا
آخر عمر از اين ويروس پاک نمی شود
و همسران اين افراد در خطر ابتلا به سرطان
گردن رحم خواهند بود. (شکل زير)



۵- سيفيليس: (زخم بدون درد ناحية تناسلي)
يکی از چهار بیماری‌های اولیه آمیزشی است که