

بیضه باعث می‌گردد که اگر بیضه دچار سرطان شد زودتر  
و در زمانیکه قابل درمان است تشخیص داده شود.

#### بیماران با سرطان بیضه چه علائمی دارند؟

شایع ترین علامت بیماران که موجب مراجعت آنها به پزشک می‌شود بزرگ شدن و سفتی بیضه بدون درد و یا لمس توده سفت در بیضه می‌باشد. بیضه مبتلا معمولاً به تدریج بزرگ شده و بیمار در بیضه احساس سنگینی می‌کند. در موارد کمی بیماران با درد حاد بیضه مراجعت می‌کنند و یا با علائم ناشی از پیشرفت بیماری مانند درد پشت، تهوع، استفراغ، بی اشتیاهی، سرفه، تنگی نفس، درد استخوان یا ورم پاها مراجعه می‌نمایند.


بالمس هرگونه توده سفت در بیضه و یا بزرگ شدن بیضه شخص باید فوراً به پزشک مراجعت کند.

#### چگونه سرطان بیضه تشخیص داده می‌شود؟

در معاینه، پزشک معمولاً توده سفت بدون درد در بیضه لمس می‌کند و با انجام سونوگرافی بیضه ها و آزمایش های خونی ویژه سرطان بیضه را تشخیص می‌دهد. تاخیر در مراجعت به پزشک می‌تواند باعث پیشرفت و گسترش سرطان بیضه به سایر محل ها و غیر قابل علاج شدن آن بشود.

#### سرطان بیضه چیست؟

سرطان بیضه رشد سرطانی سلولهای بیضه می‌باشد که به صورت یک توده سفت اغلب بدون درد در بیضه خود را نشان می‌دهد (شکل ۲). علت ایجاد آن مانند اغلب سرطان‌های انسان می‌باشد. سرطان بیضه در اغلب موارد یک طرفه است اما گاهی ممکن است دوطرفه باشد.



(شکل ۲)

#### سرطان بیضه در چه سنینی شایع است؟

سرطان بیضه شایع ترین بدخیمی در مردان ۲۰ تا ۳۵ سال دیده می‌شود.

#### آیا می‌دانید بیضه نزول کرده بیشتر در معرض

#### ابتلا به سرطان می‌باشد؟

در برخی افراد که بیضه آنها پایین نیامده و در محل طبیعی خود در کیسه بیضه قرار نگرفته است خطر ابتلا به سرطان بیضه بیشتر از افراد عادی است. این خطر حتی پس از جراحی همچنان باقی می‌ماند. ولی جراحی و پایین آوردن

#### بیضه چیست؟

بیضه‌ها یک جفت ساختمان تخم مرغی شکل هستند که به بند بیضه آویزان بوده و در کیسه‌ای پوشیده به نام کیسه بیضه قرار گرفته‌اند. اندازه بیضه‌ها با یکدیگر کمی متفاوت است. لوله‌ای که اسperm را از بیضه خارج می‌کند اپی دیدیم نامیده می‌شود و در پشت بیضه قرار گرفته است. (شکل ۱)



(شکل ۱)

#### چه بیماری‌هایی میتواند بیضه را درگیر کند؟

بیماری‌های شایع عبارتند از: عفونت بیضه، بیضه نزول نکرده، پنج خورده‌گی بیضه و سرطان بیضه می‌باشند.

# سرطان بیضه




انجمن اورولوژی ایران




آیا می دانید معاینه بیضه توسط خود شخص مهم  
ترین راه تشخیص بموقع سرطان بیضه است؟

بهترین زمان معاینه هنگام حمام کردن است که  
پوست کیسه بیضه شل می باشد یا شب قبیل از خواب  
در رختخواب ، به هرگونه تغییر ظاهری و سفتی بیضه  
می باشیست دقت نمود و بیضه ها باید به طور دقیق بین  
انگشت شست و سایر انگشتان هردو دست معاینه شوند.



(شکل ۳)

معاینه بیضه توسط شخص بهترین راه تشخیص بموقع  
سرطان بیضه است. هرگونه نکته غیر طبیعی در بیضه ها  
باید با پزشک متخصص اورولوژی در میان گذاشته شود.



پروست ارب ای . اس . آی  
Prosterbe ESI

تلفن مشاوره : ۲۲۶۰۷۰۰۱

بیماران با سرطان بیضه در چه مرحله ای از  
بیماری ممکن است مراجعه کنند؟

سرطان بیضه در سه مرحله ممکن است تشخیص داده شود:

۱- وقتی که سرطان محدود به بیضه می باشد.

۲- وقتی که سرطان به عقده های لنفی شکم نیز  
گسترش یافته است.

۳- وقتی که سرطان علاوه بر بیضه و عقده های لنفی  
شکم به ساختمان های دیگر مانند ریه و کبد نیز دست  
اندازی کرده است.

چه درمان هایی برای سرطان بیضه وجود دارد؟

درمان بسته به نوع سرطان و مرحله آن متفاوت است، اما  
درمان مشترک در تمامی موارد خارج کردن بیضه مبتلا به  
سرطان با جراحی می باشد بر حسب میزان پیشرفت و نوع  
سرطان درمان های دیگر نیز ممکن است لازم شود این  
درمان ها عبارتند از: شیمی درمانی، اشعه درمانی و جراحی  
وسعی شکمی برای خارج کردن عقده های لنفی شکم.

در صورتی که بیضه طرف دیگر سالم باشد،  
خارج کردن یک بیضه تاثیری در عملکرد  
جنسی و باروری شخص نخواهد داشت.  
با تشخیص و درمان بموقع سرطان بیضه ریشه  
کن می گردد.