



مراقبت از لثه در دوران بارداری

مقدمه

■ در مراحل ابتدایی، لثه اندکی قرمز شده و تورم دارد، هنگام مسوک زدن از آن خون می آید و حتی ممکن است احساس بوی نامطبوع دهانی بوجود آید که این علائم به دلیل وجود باکتری و پلاک میکروبی روی دندان و لثه است که در حال ایجاد عفونت هستند. در این مرحله هنوز استخوان اطراف دندانها تخریب نشده است و می توان با آموزش صحیح مسوک زدن و انجام جرمگیری بیماری را درمان کرد.

در صورت عدم پیشگیری مرحله ابتدایی بیماری لثه، عفونت باکتریها از لثه ها عبور کرده به استخوان اطراف دندانها تهاجم و باعث تخریب استخوان و بافت‌های نگهدارنده دندانها شوند.

بنابراین بایستی موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

- ۱ استفاده مرتب و صحیح از مسوک
- ۲ استفاده مرتب و صحیح از نخ دندان
- ۳ تغذیه صحیح و مناسب
- ۴ مراجعه به دندانپزشک طی دوران بارداری

“ گروه های هدف این متن آموزشی

- مادران
- رابطین بهداشتی

منابع استفاده شده در تهیه این متن آموزشی

- مجموعه کتب آموزش بهورزی / قسمت بهداشت دهان و دندان / سال انتشار ۱۳۸۴ دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در دوران بارداری ، لثه ها و دندانها همچون دیگر نسوج بدن تحت تاثیر شرایط خاص حاملگی قرار می گیرند. به دلیل تغییرات هورمونی در دوران حاملگی اغلب التهاب لثه (ژئنوتیت حاملگی) در ماه دوم یا سوم بروز نموده و تا ماه هشتم شدت آن افزایش می یابد و پس از آن در دوران پس از زایمان روند کاهشی دارد. حساسیت لثه ممکن است سبب شود مادر باردار به خوبی از مسوک و نخ دندان استفاده ننماید، در نتیجه پلاک میکروبی بر روی دندانها بصورت مستمر تشکیل شده و به خوبی تمیز نشده و التهاب لثه و پیشرفت بیماری را بدتر می نماید.

■ پلاک، یک لایه نازک و بی رنگ است که از تجمع دیامی باکتریها بر روی دندانها ایجاد می شود. اگر پلاک ها به موقع از سطح دندانها پاک نشوند می توانند به بیماری لثه منجر شوند.
 ■ جرم دندان، در واقع پلاکی میکروبی است که سخت شده و کاملاً قابل مشاهده است. علامت مشخصه آن وجود لکه های زرد یا قهوه ای بر روی دندان و لثه می باشد.



■ بیماری لثه با آماس شروع می شود که بیماری در این مرحله به راحتی قابل درمان است. علائم ورم و التهاب (حساسیت و خونریزی لثه) هنگام مسوک زدن می باشد ممکن است مراحل پیشرفتی بیماری لثه به از دست دادن دندانها بیانجامد.