

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا ابتدای مرداد ۱۴۰۲

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	بیماری	محصول	کارنس	دز مصرف	تاریخ ثبت
۱	اپوکسی کونازول+تیوفانات متیل	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	بیماری فوزاریمی سنبله	گندم	۴۲ روز	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۳/۲۷
۲	اپوکسی کونازول+تیوفانات متیل	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	زنگ زرد	گندم	۴۲ روز	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۶/۲۷
۳	اپوکسی کونازول+تیوفانات متیل	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	چغندر قند		۰/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۷/۱۶
۴	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	جالیز- مزرعه، گلخانه	خیار: ۲ روز	مزرعه: ۱ لیتر در هکتار	۸۸/۹/۳۰
								۲ روز	گلخانه: ۰/۷۵ در هزار	
۵	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه برگ سرکوسپورایی	چغندر قند	-	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۱۰/۲۲
۶	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه موی	گوجه فرنگی	-	۱۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۷	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	سفیر	۳۲/۵٪	SC	بارزگانان سرای سپند	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶
۸	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	دیفوروبین	۳۲/۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶
۹	آزوکسی استروبین+ سیپروکونازول	امیستاراکسترا	۲۸٪	SC	سینجنتا	زنگ زرد	گندم	۳۵ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷

۱۰	آزوکسی استروبین ۱۲۵g/l + دیفنوکونازول ۱۲۵ g/l	آمیستار گلد	۲۵٪	SC	سینجنتا	سپتوریای برگ	گندم		یک لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۱	اسپیروکسامین + تبو کونازول + تریادیمنول	فالکن	۴۶٪	EC	بایر آگ	زنگ زرد	گندم	۳۰ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷
۱۲	اسپیروکسامین + تبو کونازول + تریادیمنول	فالکن	۴۶٪	EC	بایر آگ	فوزاریوم سنبله	گندم	۳۰ روز	۰/۷-۰/۸ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۲۵
۱۳	اکسی کلرور مس	اکسی کلرور پرتونار	۳۵٪	SC	پرتونار ویمال هند	سفیدک کرکی	خیار	۳-۷ روز	۳/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۲۰
۱۴	اکسی کلرور مس	کیمیا کوپر اکسی	۳۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان شیام کمیکالز	سفیدک کرکی	خیار	۳-۷ روز	۳/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱
۱۵	اکسی کلرور مس + سیمو کسانیل	کوپروسیت سی	۴۳/۹۵٪	WP	دلنا پارس نهاده اگریا	سفیدک داخلی	خیار	۵ روز	۳ کیلو گرم در هکتار	۹۴/۶/۲۳
۱۶	اکسی کلرید مس + مفنوکسام (متالاکسیل ام)	ریدومیل گلد آر	۱۶/۱۹٪	WG	سینجنتا	سفیدک کرکی	خیار	۳ روز	گلخانه: ۶ در هزار فضایی باز: ۶ کیلوگرم در هکتار (دوبار سمپاشی در فصل زراعی به فاصله ۱۴ روز)	۱۴۰۰/۹/۲۹
۱۷	اکسید مس	ردشیلد	۴۵٪	WG	رها اندیش کاوان	آنتراکنوز	گردو	-	۲ در هزار	۹۹/۱۱/۶
۱۸	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.اس نروژ	آتشک	درختان میوه دانه دار	۱۵ روز	۱ در هزار	۹۱/۶/۲۰
۱۹	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.اس نروژ	پپچیدگی برگ	هلو	۱۵ روز	۲/۵ در هزار	۹۰/۴/۱۳

۲۰	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.آس نروژ	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۱۵ روز	۱ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۷/۶
۲۱	اکسید مس	رد شیلد	۴۵٪	WG	رها اندیش کاوان Nordox	شانکر باکتریایی <i>Pseudomonas syringae</i>	درختان میوه هسته دار	۱۵ روز	۲ در هزار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۲۲	اکسید مس	نوردوکس	۷۵٪	WG	نوردوکس آ.آس نروژ	پوسیدگی طوقه و ریشه	برنج	-	۱۳۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	۹۶/۴/۱۹
۲۳	اکسید مس (نوردوکس) ۲۵/۸٪+متالاکسیل ۶٪	نوردوکسیل	۳۱/۸٪	SC	پیرا کشت Zhejiang Heben Pesticides and chemical	سفیدک داخلی	توتون	-	۱/۵ لیتر در هکتار (خزانه)	۱۴۰۰/۹/۲۹
									۲ لیتر در هکتار (مزرعه)	
۲۴	اکسی کلرور مس (دارای ۵۸/۳٪ مس)	کوپراکسی کلرید مس برزگر	۸۵٪	WP	برزگر برجسته Agro life Science corporation	پیچیدگی برگ	هلو	-	۴ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۲۵	اکسی کلرور مس	کوپر پلاس	۵۰٪	WP	آرمان سبز آدینه شیام کمیکالز	سفیدک کرکی	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ در هزار	۱۴۰۰/۴/۱۴

۲۶	آمتو کترادین + دیمتومورف	اوروگو	۵۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	خیار (فضای باز و گلخانه)	۱ روز	۰/۷ در هزار استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۹۷/۱۰/۱۷
۲۷	آمتو کترادین + دیمتومورف	اوروگو	۵۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	هندوانه	۱ روز	۰/۷ در هزار در فواصل زمانی ۱۰-۷ روز جهت کنترل بیماری	۹۹/۲/۸
۲۸	آمتو کترادین + دیمتومورف	اوروگو	۵۳/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	انگور	۱ روز	۱ در هزار، در فواصل زمانی ۷-۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۹۹/۴/۳۰
۲۹	امستوپرایم	پنفلوفن	۵٪	FS	بایر	شانکر ریزو کتونایی و شوره سیاه	سیب زمینی		۴۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری به صورت ضد عفونی	۱۴۰۲/۴/۱۹
۳۰	ایپرودیون	رورال	۵۰٪	WP	بایر آگ	شانکر ریزو کتونایی ساقه و	سیب زمینی	-	۲٪ وزن غده	۸۶/۱۰/۱۰
۳۱	ایپرودیون ۱۷۵ + کاربندازیم ۸۵ (گرم /لیتر)	رست آپ	۲۶٪	SC	پاک سم ایرانیان jiangsu Lanfeng	شانکر ریزو کتونایی ساقه و شوره سیاه غده	سیب زمینی	-	۴ لیتر به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری	۹۹/۴/۳۰
۳۲	ایزوپروتیولان	فوجی وان	۴۰٪	EC	نیپون نوهیاکو	بلاست	برنج	۱۴ روز	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۹۶/۳/۱
۳۳	ایمینو کتادین تریس	بلکیوت	۴۰٪	WP	نیپون سودا	سفیدک پودری	خیار	۱ روز	۰/۷۵-۰/۷۰ کیلوگرم در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۳۴	ایمینو کتادین تریس	بلکیوت	۴۰٪	WP	نیپون سودا	لکه موجی (آلترناریا)	سیب زمینی	۷ روز	۷۵۰ گرم در هکتار	۹۳/۳/۱۲
۳۵	ایمینو کتادین تریس	بلکیوت	۴۰٪	WP	نیپون سودا	سفیدک پودری	انگور	۷ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۵/۸/۲۴

۹۷/۲/۲۴	۱۸۰ گرم در هکتار	۲ روز	برنج	بلاست	گیاه پرنیان اطلس Deqiang Biology	WP	۵٪	کانگ می	باسیلوس سوبتیلیس	۳۶
۱۴۰۱/۴/۲۰	۱/۲۵ در هزار	-	گوجه فرنگی	لکه موجی آلترناریایی	گیاه پرنیان اطلس Deqiang Biology	WP	۵٪	کانگ می	باسیلوس سوبتیلیس	۳۷
۹۸/۸/۲۷	در سه مرحله به ترتیب با دزهای ۵،۵ و ۴ لیتر در هکتار	ندارد	گوجه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریوم	رویون تيسان	SC	۱۰ ^۸	پارس باسیل	باسیلوس ولزنسیس	۳۸
۹۸/۱۰/۹	۵ در هزار	ندارد	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	بایرآلمان	SC	۱۰ ^{۱۲}	سرناد	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	۳۹
۱۴۰۰/۹/۲۲	۱۰ لیتر در هکتار به روش خیساندن خاک پس از انتقال نشاء	ندارد	گوجه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریومی	بایرآلمان	SC	۱۰ ^{۱۲}	سرناد	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	۴۰
۹۹/۴/۳۰	۲۰۰ گرم در هکتار، ۴۵ و ۹۰ روز پس از کاشت	ندارد	چغندر قند	پوسیدگی ریزوکتونایی ریشه	زیست فناور سبز	پودر مرطوب	۱۰ ^۷	رویین ۱	باسیلوس سوبتیلیس	۴۱
۹۳/۱۲/۴	۱۰ در هزار دو مرحله	۷ روز	زردآلو	بیماری غربالی	سبزآور پردیس	SC	۱۸٪	میشو بردوکس	بردو	۴۲
۹۴/۱۰/۷	۲ درصد محلول پاشی توأم با پانسمان شانکر با بردو کیمیا ۸ درصد	۷ روز	درخت سیب	شانکر سیتوسپرای	کاوش کیمیا کرمان	SC	۱۸٪	بردو کیمیا	بردو	۴۳

۹۶/۱۱/۱۶	۱۰ در هزار	۷ روز	زردآلو	غریالی	البرز بهسم	SC	۱۸٪	بردو بهسم	بردو ماده موثره سولفات مس و هیدروکسید کلسیم	۴۴
۹۶/۲/۲۵	۸ در هزار در مرحله جوانه و ۵۰ در هزار در مرحله ۵ درصد، ۱۰۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل	۷ روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	سبزآور نگین فلات	SC	۱۸٪	بردوسیف	بردو	۴۵
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	سبزآور نگین فلات	SC	۱۸٪	بردوسیف	بردو	۴۶
۹۸/۳/۲۷	۸ در هزار	-	هلو	پپچیدگی برگ	سبزآور نگین فلات	SC	۱۸٪	بردوسیف	بردو	۴۷
۹۶/۳/۱	۵-۸ در هزار در زمان ریزش برگ-ها در پاییز و تورم جوانه-ها در بهار	۷ روز	هلو	پپچیدگی برگ	سمیران	SC	۲۰٪	بردو سمیران	بردو	۴۸
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	اکسین شیمی آدان	SC	۲۰٪	بردوکسین	بردو	۴۹
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	پرتونار	SC	۲۰٪	بردوتکس	بردو	۵۰
۹۸/۳/۲۷	۹ در هزار	-	هلو	پپچیدگی برگ	پرتونار	SC	۲۰٪	بردوتکس	بردو	۵۱
۹۷/۳/۲۸	۵ در هزار	۷ روز	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	بردو	۵۲
۹۷/۸/۱۴	۱۰ در هزار در مرحله جوانه و ۴ در هزار در مرحله ۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد گل	۷ روز	دانه دار	آتشک درختان میوه	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	بردو	۵۳
۹۸/۳/۲۷	۲/۵ در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	باغبان تاک	SC	۸۰٪	سولفیکس	بردو	۵۴

۹۸/۳/۲۷	۱۰ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	بردو	۵۵
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	بردو	۵۶
۹۷/۱۲/۱۳	۹ در هزار	-	زردالو	غربالی	گیاه	SC	۲۰٪	بردوجی	بردو	۵۷
۹۹/۴/۳۰	۱۵ در هزار	-	زردالو	غربالی	فراوره-های طیف سبز	SC	۱۸٪	بردوطیف	بردو	۵۸
۱۴۰۰/۹/۱۵	۵ لیتر در هکتار	۳ روز	سیب زمینی	سفیدک کرکی	خزرم کود مانیکا ایتالیا	SC	۱۰٪	MANIFLOW	مخلوط بردو	۵۹
۹۹/۶/۲۴	۳ کیلوگرم در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش های ثبت شده	۷ روز	خیار	سفیدک کرکی	خزرم کود	WP	۳۳٪	توتور	مخلوط بردو(CU) + ۱۵٪ فوزتیل آلومینیوم ۱۸٪	۶۰
۹۸/۱۰/۲۳	یک در هزار(حداکثر دو بار در سال)	-	گوجه فرنگی	سفیدک پودری	بازرگانان سرای سپند پارس Shandong Kangqiao	WG	۳۸٪	یونیلیس	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	۶۱
۸۹/۹/۲۹	۰/۷ در هزار مناطق خشک، ۱ در هزار مناطق مرطوب	۷ روز	هلو- شلیل	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	۳۸٪	بلیس	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	۶۲
۹۷/۱۲/۱۳	۰/۷ در هزار و در تناوب با سایر قارچکش-ها و حداکثر دوبار درسال	-	سیب درختی	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	۳۸٪	بلیس	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	۶۳
۹۴/۱۲/۱۰	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	آلترناریا	ب آ اس اف	WG	۳۳/۴٪	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	۶۴

۹۵/۳/۱۷	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	سیب زمینی	آلترناریا	ب آ اس اف	WG	۳۳/۴٪	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلوستروبین	۶۵
۹۸/۱۱/۲۸	۱/۵ در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کش-ها و حداکثر دوبار در سال	۳ روز	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	ب آ اس اف	WG	۳۴/۴٪	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلوستروبین	۶۶
۹۹/۳/۱۲	۱/۵ کیلو گرم در هکتار حداکثر دو مرحله و با رعایت فاصله ۱۴	۳ روز	کاهو	افتادگی برگ	ب آ اس اف	WG	۳۳/۴٪	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلوستروبین	۶۷
۱۴۰۰/۷/۲۶	۱/۲۵ در هزار	۳ روز	خیار	کپک خاکستری	ب آ اس اف	WG	۳۳/۴٪	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلوستروبین	۶۸
۸۹/۹/۲۹	۰/۵ در هزار	۷ روز	هلو- شلیل	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	کولیس	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	۶۹
۹۶/۹/۱۳	۰/۴ در هزار	-	خیار	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	کولیس	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	۷۰
۹۸/۴/۱۰	۰/۵ در هزار	-	گوجه فرنگی (فضای باز)	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	کولیس	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	۷۱
۹۰/۱۲/۱	۵ در هزار	-	جالیز- گلخانه	سفیدک پودری	کیمیا سبز آور	SP	۸۵٪	کالیبان	بی کربنات پتاسیم	۷۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۰/۷ در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	سینجنتا	SC	۲۰٪	میراویس دیوو	پایدیفلومتوفن ۷۵ گرم/کیلو گرم+دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/کیلو گرم	۷۳
۹۷/۱۲/۱۳	یک لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	بهاور شیمی آستک	EC	۲۵٪	بهتیل	پروپیکونازول	۷۴
۹۹/۶/۲۴	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۲۱	گندم	سپتوریوز	گیاه پرنیان اطلس Safa tarim	EC	۳۰٪	هاربور	پروپیکونازول ۱۵ درصد+ دیفنوکونازول ۱۵ درصد	۷۵

۷۶	پروتیو کونازول + تبو کونازول	لاماردور	۴۰٪	FS	بایر آگ	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۱۰-۱۵ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۷۷	پروتیو کونازول + تبو کونازول	لاماردور	۴۰٪	FS	بایر آگ	سیاهک آشکار	گندم	-	۲۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۹/۱
۷۸	پروتیو کونازول + تبو کونازول	لاماردور	۴۰٪	FS	بایر آگ	سیاهک آشکار	جو	-	۱۵ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۹۶/۴/۱۹
۷۹	پروپامو کارب هیدرو کلراید و فوزتیل آلومینیوم	پرویکور انترژی	۸۴٪	SL	بایر آگ	بوته میری	خیار	۳ روز	۳ لیتر در هکتار در مزرعه به صورت شنی در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۰/۳ لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۹۲/۷/۸
۸۰	پروپامو کاب هیدرو کلراید + فلوپیکولید	اینفینیتو	۶۸/۷۵٪	SC	بایر آگ	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۱ روز	۲ در هزار	۹۲/۸/۷
۸۱	پروپامو کاب هیدرو کلراید + فلوپیکولید	اینفینیتو	۶۸/۷۵٪	SC	بایر آگ	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۷ روز	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶
۸۲	پروپامو کارب هیدرو کلراید + سیموکسانیل	پروکسانیل	۴۵٪	SC	بازرگان کالا Arysta life science	سفیدک داخلی	سیب زمینی	-	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶

۱۴۰۰/۹/۲۹	۲ در هزار	۳-۷ روز	خيار	سفیدک داخلی	دلتا پارس نهاده آگريا	SC	۴۵٪	ريوالدو	پروپامو کارب هيدروکلرايد+ سيموکسانيل	۸۳
	۲ ليتر در هکتار در فضای باز									
۹۶/۱۱/۳۰	۱ در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و ۰/۷۵ در هزار دو هفته پس از انتقال نشا	-	خيار	بوته ميري <i>Pythiumaph nidermatum</i>	بازرگان کالا Arysta life science	SL	۷۲/۲٪	پروپلنت	پروپامو کارب هيدروکلرايد	۸۴
۹۷/۱۲/۱۳	نيم ليتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	EC	۳۵/۵٪	اينوور	پروپيکونازول+فلوکساپيروکساد+پيراک لواستروبین	۸۵
۹۲/۸/۲۷	۰/۹ گرم در هر متر مربع	-	قارچ خوراکی	پوسیدگی خشک	فرتی اگرو	WP	۵۰٪	آکورد	پروکلراز	۸۶
۹۹/۴/۳۰	۱- ۱/۲۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	-	سيب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی	باير آ گ	FS	۲۵٪	پنسیکرون	مونسرن	۸۷
۹۷/۱۰/۱۷	۰/۳۵ در هزار (بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	-	خيار (گلخانه)	سفیدک داخلی	برزگر برجسته Jiangsu Greenscie Chemical	DF	۱۸/۷٪	پيراديم	پيراکلواستروبین + ديمتومورف	۸۸
۱۴۰۱/۴/۲۰	۰/۷۵ در هزار	-	پسته	سوختگی الترناریایی	برزگر برجسته Jiangsu Greenscie Chemical	DF	۱۸/۷٪	پيراديم	پيراکلواستروبین + ديمتومورف	۸۹
۹۹/۳/۱۲	۱/۵ ليتر در هکتار	-	گندم	سفیدک پودری	ب آ اس اف	EC	۲۲/۵٪	پرياکسور	پيراکلواستروبین + فلوکساپيروکساد	۹۰

۹۱	پیری متانیل	میلیس	۳۰٪	SC	گیاه پرنیان اطلس Safa tarim	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	-	یک در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کشمها و حداکثر دوبرار درسال	۹۸/۱۱/۲۸
۹۲	<i>Pythium Oligandrum</i> Drechsler	پلی ورسوم		WP	بازارگان کالا Biopreparaly	عامل پیشگیرانه بیماری گیاهچه میری	خیار گلخانه	-	۰/۴-۰/۳ در هزار در طول فصل رویش همراه با آب آبیاری دوبرار در فصل کاشت	۱۴۰۰/۹/۱۵
۹۳	تالارومیسس فلاووس	تالارومین	۱۰ ^۹	ذرات جامد قابل انتشار در آب	بهاران دشت ساحل	پژمردگی ورتیسیلیومی	سیب زمینی	ندارد	۶۰ کیلوگرم برای بذرمال کردن ۴ تن غده سیب زمینی در هکتار	۹۷/۲/۳۰
۹۴	تبوکونازول	فولیکور	۲۵٪	EW	بایر آگ	پوسیدگی اسکلروتینیایی	ساقه کلزا	-	۱ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۱۱
۹۵	تبوکونازول	آرتمیس	۶٪	FS	بیستر فیلد	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۵۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۹۵/۹/۲۹
۹۶	تبوکونازول	تبوکور	۲۵٪	EW	گل سم گرگان نینگ بوسانجوی	زنگ زرد	گندم	-	یک لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۹۷	تبوکونازول	تایدتیو	۴۰٪	SC	گیاه پرنیان اطلس تاید کراپ-ساینس	زنگ زرد	گندم	-	۰/۴ لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۹۸	تتراکونازول	لوسپل	۱۲/۵٪	LS	ایزاگرو	سیاهک آشکار	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۱۰/۱۳
						سیاهک پنهان		-	۳۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	

۹۹	تبوکونازول+ آزوکسی استروبین	آذیلون	۳۲٪	SC	آریاشیمی Ningbo + Sunjoy Jiangsu	سفیدک پودری	رز	-	یک در هزار	۹۸/۱۰/۲۳
۱۰۰	تتراکونازول+آزوکسی استروبین	آفیانس	۱۸٪	SC	بازرگان کالا Isagro	سفیدک پودری	هلو	-	۰/۶ در هزار	۱۴۰۱/۴/۲۰
۱۰۱	تتراکونازول+آزوکسی استروبین	آفیانس	۱۸٪	SC	بازرگان کالا Isagro	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۰۲	تبوکونازول + پیراکلواستروبین	پیلارتب	۳۴/۵٪ (۳۴۵ گرم/لیتر)	SC	ساعی گل تهران Jiangsu Mindleader crop science	سفیدک پودری	گندم	-	۶ دهم لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۰۳	تتراکونازول	دومارک	۱۰٪	EC	ایزاگرو	سفیدک پودری	جالیز	۳ روز	۰/۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۸۸/۸/۱۱
									۰/۴ در هزار در گلخانه	
۱۰۴	تتراکونازول	دومارک	۱۰٪	EC	ایزاگرو	سفیدک پودری	سیب	۱۴ روز	۰/۳ در هزار	۹۲/۳/۲۷
۱۰۵	تتراکونازول	امی نت	۱۲/۵٪	ME	ایزاگرو	سفیدک پودری	چغندر قند	۲۱ روز	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۹۰/۷/۴

۱۰۶	تریادیمنول	بایتان	۷/۵٪	DS	بایر آگ	سیاهک آشکار	جو	-	۱۵۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۱۰۷	تری تیکونازول	رئال	۲۰٪	FS	ب آ اس اف	سیاهک آشکار	جو	-	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰
۱۰۸	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	جالیز- مزرعه	۱ روز	۲۰۰ گرم در هکتار	۸۸/۸/۱۱
۱۰۹	تری فلوکسی استروبین	فلینت	۵۰٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	گوجه فرنگی- مزرعه	۱ روز	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۶/۵/۲
۱۱۰	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	بلاست	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۲/۳/۶
۱۱۱	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	لکه سیاه	سیب	۱۴ روز	۰/۲-۰/۳ در هزار	۹۴/۵/۱۲
۱۱۲	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	سیب	۱۴ روز	۰/۳ در هزار	۹۵/۶/۱
۱۱۳	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	سفیدک پودری	چغندر قند	-	۲۰۰ گرم در هکتار	۹۵/۶/۱
۱۱۴	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	ناتیوو	۷۵٪	WG	بایر آگ	شیت بلایت	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۱۱۵	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	فلونازول	۷۵٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس CAC Nantong	بلاست	برنج	۲۱ روز	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴
۱۱۶	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	تیلما	۳۷/۵٪	SC	پاک سم ایرانیان &sunjoy CAC Nanton	بلاست	برنج	-	۳۲۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴
۱۱۷	تری فلوکسی استروبین ۵۰٪+ تبوکونازول ۲۵٪	ایوت	۷۵٪	WG	گل سم گرگان &sunjoy CAC Nanton	بلاست	برنج	-	۱۶۰ گرم در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴

۹۶/۲/۲۵	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین+ فلوپیرام	۱۱۸
۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین+ فلوپیرام	۱۱۹
۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین+ فلوپیرام	۱۲۰
۹۶/۵/۲	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۵ روز	گوجه فرنگی- مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین+ فلوپیرام	۱۲۱
۱۴۰۰/۷/۲۶	۴ دهم در هزار	-	خیار	کپک خاکستری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین+ فلوپیرام	۱۲۲
۹۹/۱۰/۹	یک در هزار	-	درختان سیب	سفیدک پودری	رهااندیش کاوان نیون سودا	EC	۱۵٪	تریفمین	تری فلومیزول	۱۲۳
۹۹/۱۰/۱	۷۵ / ۰ در هزار	۱۴ روز	هلو	سفیدک پودری	رهااندیش کاوان نیون سودا	WG	۱۸/۴٪	پانچو تی اف	تری فلومیزول + سایفلوفنامید	۱۲۴
۱۴۰۰/۴/۱۴	۷۵ / ۰ در هزار	۱۵ روز	هلو	مومیایی	رهااندیش کاوان نیون سودا	WG	۱۸/۴٪	پانچو تی اف	تری فلومیزول + سایفلوفنامید	۱۲۵
۹۶/۱۱/۳۰	۰/۳ در هزار	-	بادام	لکه آجری	سومیتومو	DC	۱۹٪	ساپرول	تریفورین	۱۲۶
۹۸/۱۲/۲۸	۰/۴- ۰/۵ در هزار	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	ب آ اس اف	FS	۱۲٪	اینشورپر فرم	تریتیوکونازول +پیراکلواستروبین	۱۲۷
۱۴۰۰/۹/۱	۰/۵ در هزار	-	گندم	سیاهک آشکار	ب آ اس اف	FS	۱۲٪	اینشورپر فرم	تریتیوکونازول +پیراکلواستروبین	۱۲۸

۱۲۹	تیفلوزامید	آچمز	۲۴٪	SC	گروه شهر سبز و سلامت پارسیان Shandong kangqiao	سوختگی غلاف برگ برنج(شیت بلایت)	برنج	۲۱ روز	۳۰۰ سی سی در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش ها	۹۹/۳/۲۶
۱۳۰	تیوفانات متیل + تری سیکلازول	ویستا	۷۲/۵٪	WP	نیپون سودا ژاپن	بلاست برگ و خوشه	برنج	۲۱ روز	۰/۴-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۰/۳/۳۰
۱۳۱	تریکودرماهارزیانوم	تریانوم پی	۱۰ ^۹	WP	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۳۰-۴۰ گرم برای هزار گیاه	۹۱/۲/۹
۱۳۲	تریکودرماهارزیانوم	تریانوم پی	۱۰ ^۹	WP	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	خیار گلخانه	ندارد	۳۰-۴۰ گرم برای هزار گیاه	۹۱/۲/۹
۱۳۳	تریکودرماهارزیانوم	تریانوم جی	۱۰ ^۹	G	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	طالبی	ندارد	۱۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار	۹۷/۹/۲۱
۱۳۴	تریکودرماهارزیانوم	تریانوم جی	۱۰ ^۸	G	گیاه کوپرت هلند	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۲۵۰-۳۷۵ گرم در متر مکعب	۹۷/۹/۲۱
۱۳۵	دیفنو کونازول + سایپرو کونازول	دیویدند استار	۳/۶۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک آشکار	جو	-	۲۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۳/۱۰

۱۳۶	دیفنو کونازول + سایپرو کونازول	دیویدند استار	۳/۶۳٪	FS	سینجنتا	سیاهک آشکار	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۹/۱
۱۳۷	دیفنو کونازول + سیفلوفنامید	سیدلی تاپ	۱۴٪	DC	سینجنتا	سفیدک پودری	خیار در شرایط گلخانه-ای	-	۱ در هزار (عدم کاربرد بیش از دو نوبت در طول یک فصل)	۹۷/۸/۱۴
۱۳۸	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکسادی (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	خیار گلخانه-ای	۳ روز	۰/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
۱۳۹	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکسادی (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب	۳ روز	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۱۴۰	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکسادی (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	لکه سیاه سیب	سیب	-	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۱۲/۹
۱۴۱	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکسادی (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	سیب زمینی	۷ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۷/۲۵
۱۴۲	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکسادی (xemium)	داگونیس	۱۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۴۳	دیمتومورف + پیراکلوستروبین	کابریو دو	۱۱/۲٪	EC	ب آ اس اف	آلترناریا	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ لیتر در هکتار	۹۴/۱۲/۱۰
۱۴۴	دیمتومورف + مانکوزب	آکروبات ام زد	۶۹٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۷ روز	۲ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۸/۲۵
۱۴۵	سایپرو کونازول + کاربندازیم	آلتو کمبی	۴۲٪	SC	سینجنتا	پوسیدگی اسکروتنیایی	ساقه کلزا	-	۱ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۱۱
۱۴۶	سیازوفامید	رانمن	۴۰٪	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۳ روز	۰/۴-۰/۵ در هزار	۹۱/۳/۸
۱۴۷	سیازوفامید	رانمن	۴۰٪	SC	ایشیهارا	بازدگی	سیب زمینی	-	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶
۱۴۸	سیازوفامید	رانمن	۱۰٪	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار	۹۶/۵/۲

۱۴۹	سیازوفامید	رگنانت	۲۰٪	SC	بازرگانان سرای سپند پارس شاندوگ هایلر	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	-	۰/۶ در هزار(بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	۹۷/۱۰/۱۷
۱۵۰	سولفور	سولفولاک	۸۰٪	WG	بیسترفیلد	سفیدک پودری	خیار	۱ روز	۳ کیلوگرم در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۱۵۱	سولفور	گوگرد سمیران	۸۰٪	SC	سمیران	سفیدک پودری	انگور	-	۲/۵ در هزار	۹۲/۸/۲۷
۱۵۲	سولفور	سولفور ارکیده سازان	۴۰٪	SC	ارکیده سازان	سفیدک پودری	شلیل	۲۰ روز	۳/۷۵ درهزار	۹۳/۶/۱۰
۱۵۳	سوافور	پارومی دی	۸۰٪	DF	آریا شیمی کروماندل	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۳ در هزار با مشاهده اولین علائم و در تناوب با سایر قارچ کش ها	۹۹/۳/۲۶
۱۵۴	سیپرودینیل	سیپرودین	۵۰٪	WG	آتیه نگین فلات Shaanxi hengrun chemical industry	پوسیدگی خاکستری	انگور	۱۴ روز	۱ در هزار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۵۵	سولفات مس ۱۰۲+ فسفیت پتاسیم ۵۱۹	سراکوئینت	۶۲/۲٪	SP	رهروان رویش سبز	کپک خاکستری	توت فرنگی	-	۳ در هزار	۹۸/۱۰/۹
۱۵۶	فاموکسادون+ سیموکسانیل	اکولایزر	۵۲/۵٪	WG	خزر سم کود Zhejiang Sega	سفیدک داخلی	پیاز	-	۰/۴ کیلوگرم در هکتار (مزرعه)	۹۷/۱۲/۱۳

۹۹/۶/۲۴	۴۰۰ گرم در هکتار	۱۴ روز	سیب زمینی	سفیدک کرکی	زرین خوشه جنوب Shanghai Shengnong	WG	۵۲/۵٪	زرین پرو	فاموکسادون + سیموکسانیل	۱۵۷
۹۹/۴/۹	۰/۲۵ در هزار	۱۴ روز	انگور	سفیدک پودری	الیت ساوان OAT AGRO	EC	۵٪	گاتن	فلوتیانیل	۱۵۸
۹۷/۱۰/۱۷	۳ لیتر در هکتار (در تناوب با قارچ کش های رایج)	-	سنبله گندم	فوزاریوم	کیمیا سبزینه پویا جیانگ سو	SC	۲۵٪	لیانگدی	فناماکریل	۱۵۹
۹۹/۴/۹	۰/۲۵ در هزار	۱۴ روز	انگور	سفیدک سطحی	OAT Agrio Co., LTD	EC	۵٪	گاتن	فلوتیانیل	۱۶۰
۱۴۰۱/۵/۱۰	۲۵۰ میلی لیتر به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری		سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی <i>Rhizoctonia solani</i>	سینجنتا	FS	۱۰٪	سلسست	فلودیکسانیل	۱۶۱
۱۴۰۰/۴/۲۸	۰/۱۵ در هزار	۲۱ روز	هلو	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	سرکادیس	فلوکساپیروکساد	۱۶۲
۱۴۰۰/۹/۱	۰/۱۵ در هزار	۲۱ روز	انگور	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	سرکادیس	فلوکساپیروکساد	۱۶۳
۹۲/۱۲/۵	۲/۵ در هزار	۳۰ روز	پسته	گموز	شاندونگ داچنگ	WG	۸۰٪	الیت	فوزتیل آلومینیوم	۱۶۴
۹۶/۵/۲	۲ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	گموز	دوگال	WP	۸۰٪	رودر	فوزتیل آلومینیوم	۱۶۵

۱۶۶	فوزتیل آلومینیوم	فیتوکیور	۸۰٪	WP	گل سم گرگان LiminChemical	انگومک	پسته	۱۴ روز	۲/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
۱۶۷	فوزتیل آلومینیوم + فلوپیکولید	پروفایلر	۷۱/۱٪	WG	بایر آگ	سفیدک داخلی	انگور	۷ روز	۲-۲/۵ در هزار بسته به شدت بیماری در سه نوبت	۹۵/۸/۲۴
۱۶۸	کروزکسیم متیل	استروبی	۵۰٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	کدوئیان	۴ روز	۰/۲ در هزار	۸۷/۵/۲
۱۶۹	کینوسول (سولفات ۸- هیدروکسی کینولین)	بلتانول	۳۷/۵٪	SL	سبا کوشا کشت پروبلت فیتو اسپانیا	بوته میری Phytophthora melonis	خیار (گلخانه و فضای باز)	-	۰/۵ در هزار (نوبت اول بلافاصله پس از کاشت و نوبت دوم بین مرحله ۲-۳ برگی همراه با آب آبیاری)	۹۸/۴/۱۰
۱۷۰	ماندی پروپامید+ دیفنوکونازول	کاریال استار	۵۰٪	SC	سینجنتا	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	۱ روز	۰/۷ در هزار (استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از ۴ نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۹۷/۱۰/۱۷
۱۷۱	ماندی پروپامید+ دیفنوکونازول	کاریال استار	۵۰٪	SC	سینجنتا	لکه موجی- سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	۳ روز	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق مرطوب کناره های دریای خزر و سواحل خلیج فارس	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۷۲	مایکلوبوتانیل	آتیس	۴۰٪	WP	سبزمحصول داتیس ناگارجونا اگری کم	لکه سیاه	سیب درختی	-	۰/۳ در هزار (به صورت تناوبی با قارچ-کش های دیگر)	۹۷/۹/۲۶
۱۷۳	متا بی سولفیت سدیم	سولفور پد	۷ گرم متا بی سولفیت	پد کاغذی	اروم زرین خوشه	بیماریهای قارچی	انگور	-	یک بسته ۷ گرمی برای نگهداری ۵ کیلوگرم انگور	۸۶/۸/۲۸

۹۶/۴/۱۹	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خيار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	گیاه	WP	۷۲٪	داونی جی	متالاکسیل + مانکوزب	۱۷۴
۹۳/۲/۱۵	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خيار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	بهاور شیمی	WP	۷۲٪	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	۱۷۵
۹۴/۷/۶	۳ کیلوگرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بهاور شیمی	WP	۷۲٪	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	۱۷۶
۹۹/۳/۱۲	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	کیمیا گوهر خاک Leeds	WP	۷۲٪	منکوماکسیل	متالاکسیل ۸ درصد + مانکوزب ۶۴ درصد	۱۷۷
۹۹/۹/۱۷	۲ در هزار	-	خيار گلخانه	بوته میری	ایرمان UPL	WP	۷۲٪	منکولاکسیل	متالاکسیل ۸ درصد + مانکوزب ۶۴ درصد	۱۷۸

۱۷۹	متالاکسیل ۳/۵ درصد + هیدروکسید مس ۱۸/۵ درصد	آر متیل آر	۲۲٪	SC	Industrias Quimicas Valles	پیراکشت شیمی	سفیدک داخلی	گوجه فرنگی	-	۲/۵ در هزار	۹۹/۴/۹
۱۸۰	متالاکسیل ۱۰ گرم/لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم /لیتر	ماکسیم ایکس ال	۳/۵٪	FS	سینجنتا	فوزاریوم	ذرت	۱ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱		
۱۸۱	متالاکسیل	ریدومکس	۵٪	GR	اکسیر کشاورزی یزد Zhejiang Heben	بوته میری	خیار	۲ در هزار	۹۹/۹/۱۷		
۱۸۲	متالاکسیل	ردوکسیل	۵٪	GR	گیاه Zhejiang Heben	بوته میری	خیار	۲ در هزار	۹۹/۹/۱۷		
۱۸۳	متالاکسیل	ردوکسیل	۵٪	GR	گیاه Pythium aphanidermatum	بوته میری	خیار	۲ گرم در متر مربع (گلخانه) به صورت گرانول پاشی	۱۴۰۰/۱۱/۲۵		
۱۸۴	مونو و دی پتاسیم اسید فسفونیک	فسفایت	۵۳٪	SL	J I Biotech	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۳-۴ در هزار	۹۵/۶/۲۹		
۱۸۵	متالاکسیل ام (مفنوکسام)+ آزوکسی استروبین	یونیفورم	۴۴/۶٪	EC	سینجنتا	بوته میری	خیار(گلخانه و فضای باز)	۱/۵ لیتر در هزار	۹۸/۴/۱۰		
۱۸۶	متالاکسیل ۱۰ گرم /لیتر+فلودیوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	مالوین ایکس ال ۰.۳۵ FS	۳/۵٪	SC	گیاه پرنبان اطلس Safa Tarim	پوسیدگی فوزاریومی ریشه	پیاز	۱۴ روز	۳/۵ لیتر در هکتار در مناطق با آلودگی زیاد	۱۴۰۱/۹/۱	
									۲/۵ لیتر در هکتار در مناطق با آلودگی کم		

۱۸۷	نمک های مونو و دی پتاسیم اسید فسفونیک	اگریفوس	۶۰٪	SL	بصیر شیمی Agrichem	پوسیدگی فایتوفترایی ریشه و طوقه	پسته	-	۲/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۲۹
۱۸۸	های مکسازول	تاچی گارن	۳۰٪	SL	Mitsui	پژمردگی فوزاریمی	گوجه فرنگی	۱۰ روز	قبل از انتقال نشاء یک در هزار، یک هفته بعد از انتقال نشاء دو در هزار و دو هفته پس از سمپاشی دوم به مقدار ۲ در هزار	۹۵/۱۰/۲۷
۱۸۹	هیدروکسید مس + اکسی کلرور مس	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا ISAGRO	پپچیدگی برگ	هلو	-	۱/۲ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۱۹۰	هیدروکسید مس + اکسی کلرور مس	BADGE	۲۸٪	WG	بازارگان کالا ISAGRO	سفیدک کرکی	گوجه فرنگی	سه روز	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۱۹۱	عصاره سیر ، روغن پنبه دانه، روغن ذرت	میلدی کیور	۸۳٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	سفیدک پودری	خیار	-	مزرعه: ۱۰ در هزار	۹۶/۸/۲۹
									گلخانه: ۷/۵ در هزار	
۱۹۲	اسانس روغن بنه	روماک	۶۰٪	EC	روماک گستر غرب	کپک خاکستری	توت فرنگی	ندارد	۴ در هزار	۹۸/۱۰/۹